

FAITS MARQUANTS

Carpocapse : surveillez les chenilles de deuxième génération.

Anthonome du poirier : surveillez la présence d'adultes.

Selon la précocité variétale et la localisation des vergers, les stades sont :

- Début récolte pour les pommiers.
- Récolte en cours pour les poiriers.

FRUITS A PEPINS

MALADIES

- **TAVELURE DU POMMIER – VENTURIA INAEQUALIS**

Sur certains vergers, le niveau d'infection sur fruit peut être significatif. A Vernouillet (78), 11% des poires présentent des taches de tavelure, néanmoins les surfaces atteintes restent très limitées.



Symptômes de tavelure sur poire (FREDON IDF)

Dans les parcelles où des taches sont observées, des contaminations secondaires sont possibles à partir des taches présentes sur les feuilles et/ou les fruits. Les risques de contamination vont perdurer et toute pluie annoncée devra être prise en compte pour la gestion des parcelles.

RAVAGEURS

- **CARPOCAPSE DES POMMES - CYDIA POMMELLA**

Les captures sont terminées sur l'ensemble du réseau de piégeage, à l'exception du piège situé sur un verger non-confusé à Orgeval qui a capturé 2 papillons.

Surveillez les larves de deuxième génération, car celles-ci vont entrer en



Fredon IDF

diapause pour reprendre leur cycle au printemps prochain.

| dpt | commune | s 27 | s 28 | s 29 | s 30 | s 31 | s 32 | s 33 | s 34 | s 35 | s 36 | s 37 |
|-----|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 77 | Lumigny | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gressy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vernouillet | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alluets-le-Roi | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Orgeval (non-confusé) | 28 | 15 | 7 | 2 | 17 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Torfou | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jagny-sous-Bois (non-confusé) | 15 | 20 | 16 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 95 | Saint-Brice-sous-Forêt | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Boissy-l'Aillierie (non-confusé) | 1 | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Les conditions climatiques favorables à l'accouplement et à la ponte sont les suivantes :

- T°C crépusculaire > 15°C.
- 60% < Humidité crépusculaire < 90%.
- Temps calme et non pluvieux (feuillage sec).

La ponte se fait pendant les 5 premiers jours après l'accouplement mais peut durer 12 jours. La durée entre la ponte et l'éclosion est de 90 degrés jours en base 10°C.



Des produits de biocontrôle existent.

- **ZEUZERE – ZEUZERA PYRINA**

Des captures ont été enregistrées à Torfou (91) et à Lumigny (77) avec respectivement 2 et 1 papillons capturés.



Papillon de zeuzère (Fredon IDF)

Le seuil indicatif de risque est fixé à 5% d'arbres attaqués par des larves de zeuzère (présence d'excréments sur le bois).

POIRIER

RAVAGEURS

- **ANTHONOME DU POIRIER – ANTHONOMUS PYRI**

Charançon brun-roux mesurant de 4 à 5 mm (voir photo ci-dessous), il est considéré comme un ravageur secondaire, mais dans les vergers fortement infestés les pertes peuvent être conséquentes. Les dégâts sont observables au printemps, sur des bourgeons à fruits qui ne débourrent pas. Une larve peut être encore visible à l'intérieur. Les adultes sortent de diapause estivale fin août et sont présents jusqu'à fin septembre. Les femelles pondent sur les futurs bourgeons à fruits et l'éclosion des larves a lieu en hiver.

L'anthonome du poirier adulte est actif pendant les heures qui précèdent l'aube voir encore pendant les premières heures du jour.



Dans les parcelles où des dégâts ont pu être observés au printemps, surveillez la présence des adultes par battage de rameaux (3 coups secs successifs sur 100 rameaux), de préférence au lever du jour.

Prochain BSV, jeudi 26 septembre

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Agence française de Biodiversité (AFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

- **Observations** : FREDON, Vergers de Molien, SCEA terre de saveurs, les jardins du Luxembourg, SARL RICHE
- **Rédaction** : FREDON Ile de France : Maïa Vidal
- **Comité de relecture** : DRIAAF – SRAL, Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier électronique à l'adresse suivante : ecophyto@idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. Chambre de Région d'Île de France dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.