



N° 22

13/08/26

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Écologie
Développement
Durabilité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

FAITS MARQUANTS :

TAVELURE : un risque de contamination secondaire faible à modéré peut avoir lieu si des pluies surviennent dans les prochains jours sur le poste météorologique de Bailly (78).

CARPOCAPSES : l'intensification des éclosions est terminée dans l'ensemble des stations météorologiques depuis le 6 août. Fin du vol de la 2^{ème} génération.

PETITES TORDEUSES DES FRUITS : des individus sont toujours capturés.

MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS : la pression augmente.

PUCERONS VERTS : quelques individus observés.

MOUCHES CERCLEES : des mines sont observées sur un site du réseau.

PHYTOPTES LIBRES DU POMMIER : présence sur un site suivi.

CICADELLES : des individus sont relevés.

PSYLLES : des infestations restent présentes.

METEO

Station de Feucherolles (78) :

Source : Sencrop, modèle METEOBLUE

	jeu. 13	ven. 14	sam. 15	dim. 16	lun. 17	mar. 18	mer. 19
	0	0	1.1	0	0	0	0.5
	17 / 53	18 / 46	38 / 76	39 / 97	32 / 66	50 / 74	40 / 79
	19 / 37	23 / 37	20 / 31	18 / 29	17 / 29	17 / 27	17 / 24

MALADIES

- TAVELURE DU POMMIER / POIRIER - *Venturia inaequalis* / *pyri*



Des taches de tavelure sont observées cette semaine à Jaignes (77) sur 0,1 % des fruits, ainsi que sur 1 % des pousses à Orgeval (78).

Un risque de contamination secondaire faible a eu lieu la semaine dernière dans la nuit du 9 au 10 août sur le poste météorologique de Bailly (78). Sur ce même poste, les pluies prévues les 15 et 16 août entraîneront un risque faible d'infection secondaire sur fruits ainsi qu'un risque moyen sur feuilles, si des taches sont préalablement présentes. Les précipitations prévues aux mêmes dates, pour le poste d'Attainville, ne seront associées à aucun risque de contamination secondaire, d'après le modèle.



Taches tavelures (FREDON ILE DE France)

A RETENIR

Risque : risque faible à modéré selon les postes météorologiques.

Dans les parcelles où des taches sont observées, des contaminations secondaires sont possibles à partir des taches présentes sur les feuilles et/ou les fruits dès lors que des pluies surviennent.

Pour les parcelles ne présentant pas de taches de tavelure, la période à risque est terminée.

Pour connaître le cycle de développement de la tavelure en détail, consultez le [BSV arboriculture n°3 du 13 mars 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe TAVELURE / POMMIER / Qoi-P DE SYNTHESE / SBI-IDM ou IDM / Thiophanates (MBC) / Anilinopyrimidines (AP) est exposé à un risque de résistance.

RAVAGEURS

- CARPOCAPSE - *Cydia pomonella*




La majorité des sites suivis piègent des carpocapses cette semaine, avec des niveaux allant de 4 à 68 individus selon les sites (cf. tableau ci-dessous). Comme lors des relevés précédents, seul le site d'Ecquevilly (78) en est exempt. La pression reste la même dans la majorité des vergers suivis.



Fredon IDF

	Nombre de carpocapses piégés			
	SEMAINE 27	SEMAINE 29	SEMAINE 31	SEMAINE 33
78 – Orgeval	8	7	44	43
78 – Ecquevilly	0	1	0	0
95 – Jagny-sous-Bois	87	54	11	68
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	3	74	60	45
91 – Torfou	0	1	2	4
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	0	2	7	5
77 – Jaignes	78	75	2	6
75 – Paris piège 1	0	1	6	4
75 – Paris piège 2	1	4	19	23
75 – Paris piège 3	6	1	10	5

Les niveaux de captures enregistrés cette semaine sont supérieurs à la normale ainsi qu'à ceux observés en 2022 et 2025 (voir le graphique ci-dessous).



L'intensification du vol et des pontes de la seconde génération de carpocapses adultes (période regroupant entre 20 % et 80 % des femelles et des pontes) est terminée depuis le 30 juillet dans l'ensemble des postes.

L'intensification des éclosions de la seconde génération (période regroupant entre 20 % et 80 % des larves) est, quant à elle, terminée depuis le 6 août dans l'ensemble des postes météorologiques.

Fin du vol de la 2^{ème} génération.

	Vol des femelles (2 ^{ème} génération)		Pontes (2 ^{ème} génération)		Éclosions (2 ^{ème} génération)	
	début	intensification	début	intensification	début	intensification
77-Lumigny	1-juil.	du 4 juillet au 19 juillet	3-juil.	du 10 juillet au 26 juillet	10-juil.	du 16 juillet au 2 août
77-Villenoy	1-juil.	du 5 juillet au 20 juillet	4-juil.	du 10 juillet au 26 juillet	11-juil.	du 16 juillet au 2 août
78-Les Mureaux	28-juin	du 4 juillet au 20 juillet	1-juil.	du 8 juillet au 25 juillet	9-juil.	du 14 juillet au 1 août
91-Torfou	1-juil.	du 5 juillet au 20 juillet	4-juil.	du 9 juillet au 26 juillet	10-juil.	du 14 juillet au 2 août
95-Puisieux-Pontoise	2-juil.	du 8 juillet au 23 juillet	6-juil.	du 12 juillet au 29 juillet	12-juil.	du 20 juillet au 6 août
95-Vémaris	4-juil.	du 7 juillet au 25 juillet	7-juil.	du 12 juillet au 30 juillet	13-juil.	du 20 juillet au 6 août

Pour en savoir plus, consultez [la fiche de FREDON HAUT DE France](#).



Des produits de biocontrôle existent.



LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BENZOYLUREES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ALKYL CARBAMATES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / DIACYLHYDRAZIDES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / PYRETHRINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ORGANOPHOSPHORES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / NEONICOTINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / SPINOSYNES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BACULOVIRUS EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.


• PETITES TORDEUSES DES FRUITS – *Cydia lobarzewskii*



Certains sites enregistrent une diminution des captures, c'est le cas à Orgeval (78) et Saint-Brice-sous-Forêt (95). Tandis que pour d'autres vergers, ces captures augmentent, comme à Ecquevilly (78), Jagny-sous-Bois (95) et Torfou (91) (voir le tableau ci-dessous).

	Nombre de captures de petites tordeuses			
	SEMAINE 27	SEMAINE 29	SEMAINE 31	SEMAINE 33
78 – ECQUEVILLY	0	6	0	1
78 – ORGEVAL	0	0	1	0
95 – SAINT-BRICE-SOUS-FORET	2	11	6	4
95 – JAGNY-SOUS-BOIS	1	7	2	6
77 – LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX	0	0	0	0
77 – JAIGNES	0	0	0	0
91 – TORFOU	0	1	0	3
75 – PARIS	0	0	0	0

Cette semaine, les niveaux de captures stagnent mais la moyenne des captures reste supérieure aux 4 dernières années ainsi qu'à la moyenne des 10 dernières années. (voir le graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : le seuil n'est pas encore défini. Le risque existe si des dégâts ont été observés l'année précédente.



Des produits de biocontrôle existent.

• MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS – *Ceratitis capitata*




Des cératites ont été capturées sur le site de Saint-Brice-sous-Forêt (95) à hauteur de 2 individus. Le risque augmente.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche « [La mouche méditerranéenne des fruits](#) » de FREDON Corse ou bien le poster « [Les mouches des fruits et des légumes](#) » de FDGDON Réunion.



Mouche Cératite (à gauche : FREDON Ile de France) et larve de Cératite (à droite : INRAE)

Les niveaux de captures de cette semaine sont au-dessus de ceux de l'année 2024. A l'inverse, ces relevés se situent en dessous de ceux de l'année 2022, 2023 et 2025 (cf. graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque est modéré à important. Les températures élevées actuellement enregistrées constituent des conditions favorables au développement de l'insecte.

Soyez vigilants notamment si vous observez notamment des taches brunâtres autour des points de piqûre sur les fruits ainsi que la présence de larves de 7 à 8 mm de long, présentant une extrémité antérieure effilée avec deux crochets buccaux noirs et une extrémité postérieure tronquée.



Des produits de biocontrôle existent.

• ZEUZERE – *Zeuzera pyrina*



Cinq individus ont été capturés cette semaine sur le site de Jaignes (77). Il y en avait quatre sur ce même site lors des relevés précédents.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture n°3 du 13 mars 2026](#).



Chenille dans un rameau de pommier (INRAE)

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 5 % d'arbres attaqués (observations à faire du 15 juin au 20 août).

• PUCERONS VERTS - *Aphis pomi* et *Rhopalosiphum insertum*



Des pucerons verts sont observés cette semaine sur les poiriers à Torfou (91), à hauteur de 4 % des arbres. Des auxiliaires, notamment des coccinelles, syrphes et chrysopes sont observés dans la majorité des sites suivis.

Pour avoir des informations et comprendre leur rôle dans la gestion des ravageurs, vous pouvez consulter la fiche « [Auxiliaires en verger : les et comprendre leur rôle](#) » de la Chambre d'Agriculture d'Occitanie.

Pour en savoir plus sur les différentes espèces de pucerons sur pommiers et poiriers, vous pouvez consulter : « [Les pucerons du pommier et poirier](#) », une fiche technique issue du guide Sud Arbo de la Chambre d'Agriculture Occitanie.

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 15 % de pousses touchées.

POMMIERS

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Grossissement des fruits à début récolte (pour les variétés précoces).

RAVAGEURS

• MINEUSES CERCLEES – *Eriosoma lanigerum*



L'individu adulte, de couleur gris métallique, mesure entre 6 et 8 mm de long et possède des ailes gris clair avec des taches blanches aux extrémités, entourées de liserés jaunes. La larve quant à elle, est de couleur vert-grisâtre et mesure jusqu'à 4 mm. Les dégâts de cette dernière, sont caractéristiques : mines circulaires sur la face supérieure des feuilles.



Mines de mineuses cerclées (FREDON Ile de France)

Des mines ont été observées sur le site d'Orgeval (78), mais l'infestation reste en dessous du seuil indicatif de risque.

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 100 mines pour 100 feuilles.



Des produits de biocontrôle existent.

- **PUCERONS LANIGERES – *Eriosoma lanigerum***



Aucun individu n'est observé dans l'ensemble des vergers du réseau. Lors des relevés précédents, 4 % des pousses étaient occupées par des pucerons lanigères sur les sites de Torfou (91) et Jagny-sous-Bois (95). La pression diminue pour ce ravageur.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture n°3 du 13 mars 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque devient faible.

Seuil indicatif de risque : 10 % des rameaux touchés.



Des produits de biocontrôle existent.

- **PHYTOPTES LIBRES DU POMMIER– *Aculus schlechtendali***



Des phytophtes libres du pommier sont relevés cette semaine à Jaignes (77). C'était déjà le cas lors des relevés précédents.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture n°20 du 17 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible.

Seuil indicatif de risque : 10 % de feuilles atteintes.



Des produits de biocontrôle existent.

- **CICADELLES DU POMMIER, *Empoasca maligna***



Des cicadelles sont présentes cette semaine sur le site de Jaignes (77). Des individus adultes avaient été observés lors des relevés précédents sur ce même site, ainsi qu'à Orgeval (78).

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture N°21 du 30 juillet 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

Grossissement des fruits à début récolte (pour les variétés précoces).

RAVAGEURS

• PSYLLES – *Cacopsylla pyri*



Des psylles sont toujours observés dans le réseau, avec six sites touchés. La pression augmente sur certains sites, comme à Saint-Brice-sous-Forêt (95), Jagny-sous-Bois (95) et Lumigny-Nesles-Ormeaux (77). Tandis qu'elle diminue à Ecquevilly (78), Orgeval (78) et Ussy-sur-Marne (77) (cf. tableau ci-dessous).

	Pourcentage d'organes occupés par des psylles					
	SEMAINE 31			SEMAINE 33		
	Œufs	Larves	Adultes	Œufs	Larves	Adultes
78 – Ecquevilly	4 %	36 %	4 %	10 %	10 %	0 %
78 – Orgeval	12 %	12 %	0 %	0 %	20 %	0 %
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %
95 – Jagny-sous-Bois	36 %	0 %	16 %	44 %	12 %	4 %
77 – Ussy-sur-Marne	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0 %	0 %	0 %
91 – Torfou	16 %	16 %	8 %	0 %	4 %	0 %
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %

A RETENIR

Risque : le risque est modéré.

Stade de sensibilité : toute la saison.

Seuil indicatif de risque : risque en absence d'auxiliaires quel que soit le stade.

METHODES ALTERNATIVES :

L'argile peut perturber l'installation des psylles. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'argile consultez la [Fiche 13 du guide Ecophyto fruits : argiles \(kaolinite calcinée\)](#).



Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /ORGANOPHOSPHORES EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.



La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>.

Les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : <http://substances.itab.asso.fr/fiches-filiere>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière arboriculture fruitière. <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-arboriculture-r735.html>.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>.

- **Observations** : FREDON Ile de France, Les Vergers de Molien, Le Jardin du Luxembourg.
 - **Rédaction** : FREDON Ile de France, Céline GUILLEM, Antoine DHENIN.
 - **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France, SRAL Ile-de-France.
-