



N° 23

27/08/26

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
Écologie
Développement
Durabilité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

FAITS MARQUANTS :

TAVELURE : si les précipitations prévues surviennent, des risques de contamination secondaire faibles à élevés sont attendus dans les prochains jours.

CARPOCAPSES : le vol de la 3^{ème} génération de carpocapses a débuté. Quelques vols, pontes et éclosions sont à prévoir. Diminution des niveaux de captures dans la majorité des sites.

PETITES TORDEUSES DES FRUITS : diminution des niveaux de captures.

MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS : un individu a été capturé.

PHYTOPTES LIBRES DU POMMIER : des individus sont toujours observés sur un site.

CICADELLES : des individus sont toujours relevés.

PSYLLES : des infestations restent présentes sur deux sites.

METEO

Station de Feucherolles (78) :

Source : Sencrop, modèle METEOBLUE

	jeu. 27	ven. 28	sam. 29	dim. 30	lun. 31	mar. 1	mer. 2
	4.1	4	1.1	0	0	1	0
	53 / 97	55 / 98	58 / 86	43 / 84	41 / 82	42 / 82	52 / 95
	18 / 27	17 / 22	16 / 23	17 / 25	16 / 24	14 / 24	15 / 24

MALADIES

- **TAVELURE DU POMMIER / POIRIER - *Venturia inaequalis* / *pyri***



Les sites de Jaignes (77), Ecqueville (78) et Saint-Brice-sous-Forêt (95) présentent des tâches de tavelure, sur 1 % ou moins des fruits.

Un risque élevé de contamination secondaire a eu lieu la semaine dernière dans la nuit du 20 au 21 août sur le poste météorologique d'Attainville (95). Sur le poste de Bailly (78), des risques de contamination secondaire faibles (issus des pluies du 19, 20, 25 et 26 août) et élevés (issus des précipitations du 22 août) ont eu lieu la semaine dernière. Les épisodes orageux de ce jour (27 août) et des deux jours à venir seront associés à des risques de contamination secondaire élevés pour le poste de Bailly (78) et moyens pour le poste d'Attainville (95). Les pluies prévues les 30 août et 2 septembre seront associées à des risques faibles sur les deux postes météorologiques, si des taches sont déjà présentes dans le verger.



Taches tavelures (FREDON ILE DE France)

A RETENIR

Risque : risque faible à important selon les dates et postes météorologiques.

Dans les parcelles où des taches sont observées, des contaminations secondaires sont possibles à partir des taches présentes sur les feuilles et/ou les fruits dès lors que des pluies surviennent.

Pour les parcelles ne présentant pas de taches de tavelure, la période à risque est terminée.

Pour connaître le cycle de développement de la tavelure en détail, consultez le [BSV arboriculture n°3 du 13 mars 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe TAVELURE / POMMIER / Qoi-P DE SYNTHESE / SBI-IDM ou IDM / Thiophanates (MBC) / Anilinopyrimidines (AP) est exposé à un risque de résistance.

RAVAGEURS

- **CARPOCAPSE - *Cydia pomonella***




La majorité des sites du réseau enregistrent une diminution des captures de carpocapses cette semaine, avec des niveaux allant de 2 à 55 individus selon les sites (cf. tableau ci-dessous). Quatre sites en sont exempts, contre un seul il y a deux semaines. Des piqûres actives sur fruits (pommes et poires) sont également relevées à Jaignes (77).



Fredon IDF

	Nombre de carpocapses piégés			
	SEMAINE 29	SEMAINE 31	SEMAINE 33	SEMAINE 35
78 – Orgeval	7	44	43	5
78 – Ecquevilly	1	0	0	0
95 – Jagny-sous-Bois	54	11	68	55
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	74	60	45	15
91 – Torfou	1	2	4	0
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	2	7	5	0
77 – Jaignes	75	2	6	11
75 – Paris piège 1	1	6	4	0
75 – Paris piège 2	4	19	23	2
75 – Paris piège 3	1	10	5	2

Les niveaux de captures enregistrés cette semaine sont supérieurs à la normale ainsi qu'à ceux observés en 2022 et 2025 (voir le graphique ci-dessous).



D'après le modèle INOKI, le vol de la 3^{ème} génération de carpocapses a débuté entre le 14 et le 25 juillet, selon les postes météorologiques. Quelques vols, pontes et éclosions sont donc à prévoir dans les jours à venir, sans toutefois qu'il n'y ait de période d'intensification. Les conditions météorologiques exceptionnelles de l'année expliquent ce phénomène, ainsi que les niveaux de captures actuels.

Pour en savoir plus, consultez [la fiche de FREDON HAUT DE France](#).



Des produits de biocontrôle existent.



LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BENZOYLUREES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ALKYL CARBAMATES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / DIACYLHYDRAZIDES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / PYRETHRINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.
 LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ORGANOPHOSPHORES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.
 LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / NEONICOTINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.
 LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / SPINOSYNES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.
 LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BACULOVIRUS EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.


• PETITES TORDEUSES DES FRUITS – *Cydia lobarzewskii*



Diminution de la pression des petites tordeuses des fruits dans la majorité des sites du réseau. Aucune capture n'a été relevée dans l'ensemble des vergers suivis, excepté à Torfou (91), où 4 individus ont été piégés (voir le tableau ci-dessous).

	Nombre de captures de petites tordeuses			
	SEMAINE 29	SEMAINE 31	SEMAINE 33	SEMAINE 35
78 – ECQUEVILLY	6	0	1	0
78 – ORGEVAL	0	1	0	0
95 – SAINT-BRICE-SOUS-FORET	11	6	4	0
95 – JAGNY-SOUS-BOIS	7	2	6	0
77 – LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX	0	0	0	0
77 – JAIGNES	0	0	0	0
91 – TORFOU	1	0	3	4
75 – PARIS	0	0	0	0

Les niveaux de captures diminuent cette semaine, mais restent supérieures aux 4 dernières années ainsi qu'à la moyenne des 10 dernières années (voir le graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque est faible.

Seuil indicatif de risque : le seuil n'est pas encore défini. Le risque existe si des dégâts ont été observés l'année précédente.



Des produits de biocontrôle existent.

• MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS – *Ceratitis capitata*




Une cératite a été capturée cette semaine sur le site de Lumigny-Nesles-Ormeaux (77). Deux individus avaient été capturés à Saint-Brice-sous-Forêt (95) il y a deux semaines.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche « [La mouche méditerranéenne des fruits](#) » de FREDON Corse ou bien le poster « [Les mouches des fruits et des légumes](#) » de FDGDON Réunion.



Mouche Cératite (à gauche : FREDON Ile de France) et larve de Cératite (à droite : INRAE)

Les niveaux de captures de cette semaine sont au-dessus de ceux de l'année 2024. A l'inverse, ces relevés se situent en dessous de ceux de l'année 2022, 2023 et 2025 (cf. graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque reste modéré à important

Soyez vigilants si vous observez notamment des taches brunâtres autour des points de piqûre sur les fruits ainsi que la présence de larves de 7 à 8 mm de long, présentant une extrémité antérieure effilée avec deux crochets buccaux noirs et une extrémité postérieure tronquée.



Des produits de biocontrôle existent.

POMMIERS

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Maturation en cours à début récolte.

RAVAGEURS

- PHYTOPTES LIBRES DU POMMIER– *Aculus schlechtendali*



Comme il y a deux semaines, des phytophtes libres du pommiers sont observés sur le site de Jaignes (77).

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture n°20 du 17 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 10 % de feuilles atteintes.



Des produits de biocontrôle existent.

- CICADELLES DU POMMIER, *Empoasca maligna*



Des cicadelles sont présentes sur le site de Jaignes (77) depuis un mois. Les autres vergers en sont exempts.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, consultez-le [BSV arboriculture N°21 du 30 juillet 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

Maturation en cours à récolte terminée.

RAVAGEURS

• PSYLLES – *Cacopsylla pyri*



La pression en psylles diminue cette semaine dans le réseau, avec seulement deux sites touchés contre cinq lors des relevés précédents. Les vergers concernés se situent à Ecquevilly (78) et Saint-Brice-sous-Forêt (95) (cf. tableau ci-dessous).

	Pourcentage d'organes occupés par des psylles					
	SEMAINE 33			SEMAINE 35		
	Œufs	Larves	Adultes	Œufs	Larves	Adultes
78 – Ecquevilly	10 %	10 %	0 %	15 %	5 %	0 %
78 – Orgeval	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	5 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %
77 – Ussy-sur-Marne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
91 – Torfou	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque devient faible à modéré.

Stade de sensibilité : toute la saison.

Seuil indicatif de risque : risque en absence d'auxiliaires quel que soit le stade.

METHODES ALTERNATIVES :

L'argile peut perturber l'installation des psylles. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'argile consultez la [Fiche 13 du guide Ecophyto fruits : argiles \(kaolinite calcinée\)](#).



Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /ORGANOPHOSPHORES EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

PHYTOPTES - *Epitremus pyri* et *Phytoptus pyri*



Des phytophages libres, ainsi que leurs dégâts associés (folletage prématuré des feuilles), sont observés cette semaine dans la majorité des sites suivis. Des phytophages à galles sont également relevés à Saint-Brice-sous-Forêt (95).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

Pour obtenir plus d'informations à propos de ces ravageurs et des dégâts qu'ils peuvent causer, vous pouvez consulter le « [BSV arboriculture n° 19 du 2 juin 2026](#) ».

METHODES ALTERNATIVES :

Vous pouvez vous référer au [BSV arboriculture n°19 du 2 juin 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIES

• ROUILLE GRILLAGEE - *Gymnosporangium sabinae*



Cette semaine, le site de Saint-Brice-sous-Forêt (95) présente des symptômes de rouille grillagée. La maladie n'avait pas été relevée lors des relevés précédents.

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV arboriculture n°12 du 13 mai 2026](#)



Rouille grillagée (FREDON Ile de France)



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.



La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>.

Les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : <http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière arboriculture fruitière. <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-arboriculture-r735.html>.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>.

- **Observations** : FREDON Ile de France, Les Vergers de Molien, Le Jardin du Luxembourg.
- **Rédaction** : FREDON Ile de France, Antoine DHENIN, Céline GUILLEM.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France, SRAL Ile-de-France.