



N° 24
10/09/26

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Édoux
Dupont
Fournier



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

FAITS MARQUANTS :

[TAVELURE](#) : risque faible voire nul.

[CARPOCAPSES](#) : quelques captures subsistent.

[MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS](#) : des captures ont été enregistrées sur un site.

[PSYLLES](#) : quelques œufs et larves sont toujours observés.

METEO

Station de Feucherolles (78) :

Source : Sencrop, modèle METEOBLUE

	jeu. 10	ven. 11	sam. 12	dim. 13	lun. 14	mar. 15	mer. 16
							
	0	0	0	0	0	0	0
	40 / 94	52 / 84	43 / 93	51 / 87	48 / 89	44 / 86	32 / 70
	8 / 21	14 / 23	13 / 24	13 / 25	16 / 27	16 / 27	15 / 25

Dernier BSV pour cette campagne.

**Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration
du BSV en faisant les observations et les piégeages sur leur
verger.**

MALADIES

- **TAVELURE DU POMMIER / POIRIER - *Venturia inaequalis* / *pyri***



Les contaminations secondaires sont possibles pour les vergers où des taches de tavelure sont présentes. Les pluies survenues localement le 8 septembre dernier ont permis d'engendrer des contaminations secondaires faibles sur fruits et jeunes feuilles.

Aucune pluie n'est attendue dans les prochains jours selon les prévisions de Météo-France. Le risque de contaminations secondaires demeure donc nul.



Taches tavelures (FREDON ILE DE France)

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul.

Dans les parcelles où des taches sont observées, des contaminations secondaires sont possibles à partir des taches présentes sur les feuilles et/ou les fruits dès lors que des pluies surviennent.

Pour les parcelles ne présentant pas de taches de tavelure, la période à risque est terminée.

Pour connaître le cycle de développement de la tavelure en détail, consultez le [BSV arboriculture n°3 du 13 mars 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe TAVELURE / POMMIER / Qoi-P DE SYNTHÈSE / SBI-IDM ou IDM / Thiophanates (MBC) / Anilinopyrimidines (AP) est exposé à un risque de résistance.

RAVAGEURS


- **CARPOCAPSE - *Cydia pomonella***



Cette semaine, seuls deux sites ont enregistré la présence d'individus dans les pièges (voir tableau ci-dessous).

	Nombre de carpocapses piégés			
	SEMAINE 31	SEMAINE 33	SEMAINE 35	SEMAINE 37
78 – Orgeval	44	43	5	0
78 – Ecquevilly	0	0	0	0
95 – Jagny-sous-Bois	11	68	55	2
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	60	45	15	6
91 – Torfou	2	4	0	0
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	7	5	0	0
77 – Jaignes	2	6	11	0
75 – Paris piège 1	6	4	0	0
75 – Paris piège 2	19	23	2	0
75 – Paris piège 3	10	5	2	0

Les niveaux de captures enregistrés cette semaine sont légèrement supérieurs à la normale ainsi qu'à ceux observés en 2022 et 2025 (voir le graphique ci-dessous).



Pour en savoir plus, consultez [la fiche de FREDON HAUT DE France](#).



Des produits de biocontrôle existent.



LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BENZOYLUREES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ALKYL CARBAMATES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / DIACYLHYDRAZIDES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / PYRETHRINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / ORGANOPHOSPHORES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / NEONICOTINOÏDES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / SPINOSYNES EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE CARPOCAPSE / POMMIER - POIRIER / BACULOVIRUS EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

• PETITES TORDEUSES DES FRUITS – *Cydia lobarzewskii*



Cette semaine, seul le site de Jagny-sous-Bois (95) a enregistré une capture (voir le tableau ci-dessous).

	Nombre de captures de petites tordeuses			
	SEMAINE 31	SEMAINE 33	SEMAINE 35	SEMAINE 37
78 – ECQUEVILLY	0	1	0	0
78 – ORGEVAL	1	0	0	0
95 – SAINT-BRICE-SOUS-FORET	6	4	0	0
95 – JAGNY-SOUS-BOIS	2	6	0	1
77 – LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX	0	0	0	0
77 – JAIGNES	0	0	0	0
91 – TORFOU	0	3	4	0
75 – PARIS	0	0	0	0

A RETENIR

Risque : le risque est nul.

Seuil indicatif de risque : le seuil n'est pas encore défini. Le risque existe si des dégâts ont été observés l'année précédente.



Des produits de biocontrôle existent.

• MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS – *Ceratitis capitata*




Trois individus ont été piégés à Saint-Brice-sous-Forêt (95). Les autres sites en sont exempts.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche « [La mouche méditerranéenne des fruits](#) » de FREDON Corse ou bien le poster « [Les mouches des fruits et des légumes](#) » de FDGDON Réunion.



Mouche Cératite
(FREDON Ile de France)

Les niveaux de capture enregistrés cette semaine sont supérieurs à ceux observés aux mêmes périodes en 2024 et 2025. Pour les années antérieures, les suivis de piégeage avaient été interrompus dès la semaine 36, ce qui ne permet pas d'effectuer de comparaison (cf. graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque reste modéré à important pour les fruits non récoltés.

Soyez vigilants si vous observez notamment des taches brunâtres autour des points de piqûre sur les fruits ainsi que la présence de larves de 7 à 8 mm de long, présentant une extrémité antérieure effilée avec deux crochets buccaux noirs et une extrémité postérieure tronquée.



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

Les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte à récolte terminée.

RAVAGEURS

• PSYLLES – *Cacopsylla pyri*



La pression en psylles est globalement faible à modéré. En effet, on observe une progression de l'activité du psylle entre les semaines 35 et 37 à Ecquevilly (78) où le pourcentage d'organes occupés par des œufs est passé de 15 % à 32 %, tandis que les larves ont progressé de 5 % à 12 %.

À Lumigny-Nesles-Ormeaux (77), quelques œufs ont également été observés en semaine 37 (4 % des organes occupés), alors qu'aucune présence n'avait été détectée en semaine 35 (cf. tableau ci-dessous).

	Pourcentage d'organes occupés par des psylles					
	SEMAINE 35			SEMAINE 37		
	Œufs	Larves	Adultes	Œufs	Larves	Adultes
78 – Ecquevilly	15 %	5 %	0 %	32 %	12 %	0 %
78 – Orgeval	0 %	0 %	0 %			
95 – Saint-Brice-sous-Forêt	5 %	0 %	0 %			
77 – Ussy-sur-Marne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
91 – Torfou	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
77 – Lumigny-Nesles-Ormeaux	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul.

Stade de sensibilité : toute la saison.

Seuil indicatif de risque : risque en absence d'auxiliaires quel que soit le stade.

METHODES ALTERNATIVES :

L'argile peut perturber l'installation des psylles. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'argile consultez la [Fiche 13 du guide Ecophyto fruits : argiles \(kaolinite calcinée\)](#).



Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE PSYLLE / POIRIER /ORGANOPHOSPHORES EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.



La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous <https://ecophytopic.fr/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>.

Les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : <http://substances.itab.asso.fr/fiches-filiere>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière arboriculture fruitière. <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-arboriculture-r735.html>.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>.

- **Observations** : FREDON Ile de France, Les Vergers de Molien, Le Jardin du Luxembourg.
 - **Rédaction** : FREDON Ile de France, Antoine DHENIN, Céline GUILLEM.
 - **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France, SRAL Ile-de-France.
-