Ile de France

Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 18
11/06/25

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office français de la Biodiversité.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : Nombreux signalements de pucerons cendrés, stade de sensibilité dépassé pour la majorité des parcelles. Signalements de larves de cécidomyies.
Pas d'observation de sclérotinia.
Dernier bulletin de la campagne.

Blé tendre : Stade grain formé à grain pâteux. Diminution du risque rouille jaune et rouille brune. Présence de pucerons des épis.

Orge de printemps : Stade grain formé à grain pâteux.

Betterave : Pucerons verts très présents sur les parcelles encore au stade de sensibilité. Noctuelles en augmentation.

Pois d'hiver : Encore quelques captures de tordeuses et faible pression maladies. Fin des observations.

Pois de printemps : Hausse des captures de tordeuses et faible pression maladies.

Maïs : Stade 8 à 14 feuilles. Premières captures de pyrales.

Pomme de terre : Aucun risque mildiou. Les infestations de pucerons sont très importantes. Les populations de doryphores progressent sans toutefois dépasser le seuil indicatif de risque.

Oignon : Aucun risque mildiou. Les infestations de thrips sont très faibles.

METEO

Station de Lieusaint (77)

	mer. 11	jeu. 12	ven. 13	sam. 14	dim. 15	lun. 16	mar. 17
	0	0	0	0.6	0	0	0
	44 / 99	41 / 70	43 / 85	46 / 94	37 / 84	34 / 84	28 / 98
	12 / 27	16 / 32	18 / 32	19 / 28	15 / 24	12 / 26	12 / 28

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE

COLZA

11 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Les grains ont commencé à se colorer dans la majorité des parcelles. D'ici 20 jours les moissons pourraient débuter.

RAVAGEURS

• Pucerons cendrés

Seules les parcelles au stade G4, soient 3 parcelles, sont encore au stade de sensibilité aux pucerons cendrés.
5 parcelles ont été observées, toutes remontent la présence d'individus :

Commune	Stade	Nb colonie / m² en bordure / en parcelle
Brières-les-Scellés (91)	G4 floraison terminée	0,7 / 0,2
Jouy-le-Châtel (77)	G5	5 / 1
Lizy-sur-Ourcq (77)	G5	2
Louan-Villegruis-Fontaine (77)	G5	4 / 0
Fontenay-Saint-Père (78)	G5	0,1 / 0

A RETENIR

Stade de de sensibilité : du stade C1 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des avortements de siliques et de l'échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en cas d'arrivée précoce par temps sec.

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m². La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle uniquement.

Risque : faible.

• Autres ravageurs

Des dégâts de cécidomyies sur siliques ont été signalés dans 2 parcelles :

- Fontenay-Saint-Père (78) : 1% de siliques attaquées en bordure et 0,3% de siliques attaquées en parcelle
- Mondreville (78) : 5% de siliques attaquées en bordure et 5% de siliques attaquées en parcelle.

MALADIES

• Sclérotinia

Il n'y a pas de signalement de sclérotinia dans les parcelles observées.

BLE TENDRE

21 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES



Cette semaine les parcelles les plus précoces atteignent le stade grain pâteux.

MALADIES

Rappel des périodes de sensibilité des maladies sur blé (*source Arvalis*)



• Rouille jaune

La pression rouille jaune reste stable.
Les variétés concernées sont PRESTANCE et SU HORIZON avec 10 % des F1 touchées par des taches de rouille jaune ainsi que la variété OREGRAIN avec 50 % des F1.
Nous arrivons en fin de période de risque.

A RETENIR

Observations à partir du stade 1 nœud.
Seuil indicatif de risque :
Variétés sensibles à assez sensibles (note ≤ 6) : dès les premières pustules à 1 nœud.
Variétés assez résistantes (note > 6) : à partir de 2 nœuds dès l'apparition de la maladie.
Risque : moyen.

• Rouille brune

Les observations de rouille brune s'intensifient.
10 parcelles présentent la maladie dans le réseau.
Deux parcelles sont attaquées sur F1, F2 et F3. Il s'agit de la variété KWS ERRUPTIUM située à Livilliers (95) et de la variété SY ADMIRATION située à Boigneville (91) plus fortement attaquée avec 100% des F2 touchées.
Les autres parcelles touchées ne présentent pas de symptômes sur la F1.
Pour les parcelles du réseau avec les variétés OREGRAIN, SU HORIZON, COMPLICE, CHEVIGNON et LG ABILENE on observe des taches de rouille brune sur la F2 du moment.
La nuisibilité est faible à ce stade.

A RETENIR

Risque à partir du stade 2 nœuds.
Nuisibilité aléatoire selon la variété et la date d'apparition.
Intervenir dès l'apparition des premières pustules sur l'une des 3 dernières feuilles.
Risque : faible à moyen.

RAVAGEURS

• Pucerons des épis

Cette semaine 10 parcelles signalent la présence de pucerons sur épis.

Nous observons 1 à 5 % de pieds porteurs sur les communes de Méré, Lommoye, Vicq (78) Abbeville-la-Rivière (91), Crouy-sur-Ourcq (77) et Livilliers (95).
Nous observons 10 à 30 % de pieds porteurs sur les communes de Boigneville, Guigneville (91) et Saint Denis les Rebais (77).

A RETENIR

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé.
Risque : faible.

ORGE DE PRINTEMPS

LE RESEAU EST COMPOSE DE 7 PARCELLES DE LA VARIETE RGT PLANET SEMEES DU 19/02 AU 20/03.
Elles sont entre le stade grain formé à grain pâteux.



• Helminthosporiose

6 parcelles signalent la maladie :
La parcelle située à Boigneville (91) avec 10 % des F1, 70 % des F2 et 90 % des F3 atteintes ;
La parcelle située à Soisy-sur-Ecole (91) avec 10 % des F1, 10 % des F2 et 20 % des F3 touchées ;
La parcelle d'Abbéville-la-Rivière (91) avec 60 % des F1 et 70 % des F2 porteuses ;
Les parcelles situées à Méré (78) et Boissy-le-Sec avec respectivement 10 % et 100 % des F3 contaminées.

A RETENIR

Risque à partir du stade 1 nœud.
Seuil indicatif de risque :
Variétés sensibles à assez sensibles : 10 % de feuilles atteintes.
Variétés tolérantes : 25 % de feuilles atteintes.
Risque : faible.

• Rhynchosporiose

Cette semaine 5 parcelles signalent la présence de rhynchosporiose.
A hauteur de 100 % sur F3 pour la parcelle située à Boissy-le-Sec (91)
Sur les parcelles situées à Abbeville-la-Rivière et Soisy-sur-Ecole (91) entre 10 et 20 % de la F2.
Ainsi que sur les parcelles de Méré (78) et Augers-en-Brie (77) à hauteur respective de 10 et 50 % de la F3.

A RETENIR

Risque à partir du stade 1 nœud.

Seuil indicatif de risque :

Variétés sensibles : 10 % de feuilles atteintes et plus de 5 jours de pluies > 1 mm.

Variétés moyennement et peu sensibles : 10 % de feuilles atteintes et plus de 7 jours de pluies > 1 mm.

• Rouille naine

Cette semaine les observations de rouille naine sont en hause : 5 parcelles sont touchées.

Les symptômes vont de 10 à 100 % de présence.

Les parcelles les plus touchées sont situées à Boigneville et Abbeville-la-Rivière (91) avec 100 % des F1 et 90 à 100 % des F2-F3 atteintes.

La parcelle de Soisy-sur-Ecole (91) présente des taches de rouille sur 40 % de la F1 et 90 % de la F2.

Enfin les dernières parcelles situées à Méré (78) et Courdimanche (91) signalent respectivement 10 % de F3 atteintes.

A RETENIR

Risque à partir du stade 1 nœud.

Seuil indicatif de risque :

Variétés sensibles à assez sensibles : 10 % de feuilles atteintes.

Variétés tolérantes : 50 % de feuilles atteintes.

Risque : faible à moyen.

• Ramulariose

1 parcelle située à Boigneville (91) présente de la ramulariose avec 10 % des F1 atteintes et 30 % des F2.

La variété RGT PLANET est moyennement sensible à la ramulariose.

L'impact sur le rendement dépend de la précocité d'attaque. Il peut atteindre 20 % du rendement (Source : ARVALIS).

A RETENIR

Risque à partir du stade épiaison.

BETTERAVE

27 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

14 feuilles vraies à 100 % de couverture.



G: germination
L: levée
CA: cotylédons accolés
CS: cotylédons séparés
CE: cotylédons étalés
2FVN: 2 feuilles vraies naissantes
2FV: 2 feuilles vraies
4FVN: 4 feuilles vraies naissantes
5FV: 5 feuilles vraies
6FV: 6 feuilles vraies
8FV: 8 feuilles vraies
10FV à 14FV: 10 à 14 feuilles vraies
60% couv: 60% couverture
80% couv: 80% couverture
90% couv: 90% couverture
100% couv: 100% couverture

90 % des parcelles observées sont entre 90 % et 100 % de couverture.

RAVAGEURS

• Pucerons

Pucerons verts :
5 parcelles sont encore au stade sensible, entre 14 feuilles vraies et 90 % de couverture.
Elles sont toutes colonisées à hauteur de 20 % à 100 % de pucerons verts aptères.

- La parcelle protégé 1 fois à Noisy-Rudignon (77) est colonisée à 80 %.
- Les 2 parcelles protégées 2 fois sont colonisées respectivement à hauteur de 24 % à Soisy-sur-Ecole (91) et 100 % à Abbéville-la-Rivière (91).
- La parcelle protégée 3 fois à Jouarre (77) est colonosisée à hauteur de 60 %.
- La parcelle protée 4 fois à Villiers-Saint-Georges (77) est colonisée à hauteur de 20 %.

Pucerons noirs :
Les pucerons noirs sont très présents dans toutes les parcelles avec des colonisations variant de 5 % à 100 % de plantes touchées. Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour le puceron noir mais son rôle est avéré dans la dissémination des virus de la jaunisse.

Peu de parcelles observées pour les auxiliaires.
Les auxiliaires, larves de syrphes, coccinelles adultes et larves et champignons entomophthorales commencent à réguler les populations de pucerons.

Une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des pucerons est consultable sur le site de l'ITB :
http://alerte.itbfr.org/pucerons/
Suite à un problème informatique, cette carte n'a pas pu etre mise à jour.

Jaunisse :
Une parcelle à Chenou (77) remonte la présence de jaunisse dans la partie témoin (non traité) à hauteur de 5 % de la surface touchée.

A RETENIR

Risque : fort.
Stade de sensibilité : levée à couverture du sol.
Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes avec pucerons verts aptères.

• Noctuelles

7 parcelles sur 15 (47 %) remontent la présence de dégâts de noctuelles avec 4 % à 68 % de plantes touchées.
2 parcelles à Livilliers (95) et Soisy-sur-Ecole (91) dépassent le seuil indicatif de risque avec respectivement 60 % et 68 % de plantes touchées.



A RETENIR

Risque : moyen.
Stade se sensibilité : de 6 feuilles à la récolte.
Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections récentes.

• Pégomyies

7 parcelles sur 15 (47 %) présentent des galeries de pégomyies à hauteur de 4 % à 8 % de plantes touchées. Elles sont toutes sous le seuil indicatif de risque.

A RETENIR

Risque : faible.
Stade se sensibilité : toute la période de végétation.
Seuil indicatif de risque : avant couverture du sol : 10 % de plantes avec au moins 1 galerie.
après couverture du sol : 50 % de plantes avec au moins 1 galerie ou présence d'asticots.

• Teigne

Sur 7 pièges relevés cette semaine 2 présentaient des papillons avec en moyenne 1,5 papillons par piège.



A RETENIR

Risque : faible.

Stade se sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Charançons

Sur 17 parcelles observées pour les piqures de pontes 13 parcelles soit 76,4 % sont touchées à hauteur de 2 % à 50 % à Chenou (77) avec 1,7 piqûre par plante en moyenne.

A RETENIR

Actuellement, aucun moyen de lutte n'est efficace contre ce bioagresseur.

POIS D'HIVER

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Les parcelles de pois d'hiver sont au stade limite d'avortement.

MALADIE

• Ascochytose

Pas de signalement cette semaine.

A RETENIR

Risque : Faible

Stade de sensibilité : A partir de 9 feuilles

Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes

• Mildiou

La parcelle située à Villenauxe-la-Petite (77) signale la présence de cette maladie avec 5 % des plantes impactées sur feuilles basses.

RAVAGEURS

• Tordeuses

Le seuil indicatif de risque pour l'alimentation humaine et production de semences est atteint pour l'ensemble des parcelles du réseau. Le seuil indicatif de risque pour l'alimentation animale est atteint dans la parcelle située à Villenauxe-la-Petite (77).

A RETENIR

Risque : Fort

Stade de de sensibilité : A partir de début floraison

Seuil indicatif de risque : 400 captures cumulées par semaine pour l'alimentation animale

100 captures cumulées par semaine pour l'alimentation humaine et production de semences

• Pucerons verts

Pas de signalement cette semaine.

A RETENIR

Risque : faible

Stade de sensibilité : Boutons floraux à fin floraison + 2-3 semaines

Seuil indicatif de risque : 20 à 30 pucerons par plante

POIS DE PRINTEMPS

9 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Les pois de printemps vont du stade jeunes gousses de 2 cm à fin stade limite d'avortement.

MALADIE

• Mildiou

Cette maladie est toujours observée sur les parcelles de Courdimanche-sur-Essonne (91) et Saint Martin-de-Bréthencourt (78) avec de 50 à 80 % de plantes touchées. Il s'agit de contaminations secondaires et dans ce cas, la nuisibilité est faible à nulle.

• Ascochytose

Il a été observé cette maladie sur 10 % des pieds sur la parcelle de Courdimanche-sur-Essonne (91).

A RETENIR

Risque : Faible
Stade de sensibilité : A partir de 9 feuilles
Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes

• Oïdium

Sur les parcelles de Courdimanche-sur-Essonne (91) et Saint Martin-de-Bréthencourt (78) avec respectivement de 10 et 70 % de plantes touchées.

RAVAGEURS

• Pucerons verts

Pas d'observation cette semaine sur l'ensemble des parcelles.

A RETENIR

Risque : Faible
Stade de sensibilité : Boutons floraux à fin floraison + 2-3 semaines
Seuil indicatif de risque : 20 à 30 pucerons par plante

• Tordeuses

A part la parcelle de Saint Martin-de-Bréthencourt (78), l'ensemble des parcelles ont atteint le seuil indicatif de risque pour l'alimentation humaine et la production de semences. Seule les parcelles d'Abbéville-la-Rivière (91) et de Mondreville (78) ont dépassé le seuil pour l'alimentation animale.



A RETENIR

Risque : Modéré à fort

Stade de de sensibilité : A partir de début floraison

Seuil indicatif de risque : 400 captures cumulées par semaine pour l'alimentation animale

100 captures cumulées par semaine pour l'alimentation humaine et la production de semences

MAÏS

6 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Cette semaine, 6 parcelles de maïs ont été observées. Les stades s'échelonnent de 8 à 14 feuilles.



RAVAGEURS

• Pyrales

Les pièges pyrales aux phéromones ont été posés, et des captures ont déjà été observées sur 2 des 6 parcelles suivies : 7 à Sourdun (77) et 32 à Vert-le-Grand (91). La moyenne des captures de cette semaine est de 3,4 papillons.



Graphique représentant la moyenne des captures

• Pucerons

Un signalement de pucerons pouvant atteindre jusqu'à 100 pucerons par plante à SOURDUN (77).

• Sésamie

Pas de captures.

POMME DE TERRE

6 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Tubérisation à floraison.

MALADIES

• Mildiou

Des pluies ont été enregistrées la semaine dernière sur tous les postes météorologiques.
Le seuil indicatif de risque a été dépassé pour les variétés sensibles pour les postes de Chailly-en-Brie (77), Orsonville (78), Etampes (91) et Faÿ-lès-Nemours (77) entre les 4 et 8 juin selon les postes météorologiques (voir tableau ci-dessous). Pour le poste de Faÿ-lès-Nemours (77), le seuil indicatif de risque a également été dépassé pour les variétés intermédiaires et résistances entre les 4 et 8 juin.
La réserve de spores est faible pour la quasi-totalité des postes météorologiques. Le poste de Faÿ-lès-Nemours (77) présente une réserve de spores très importante et celui de Chailly-en-Brie (77) une réserve de spores moyenne. Toutefois, les conditions météorologiques ne sont actuellement pas propices au développement.

Les premiers symptômes de mildiou ont été observés à Torfou (91) affectant quelques feuilles.

Stations météorologiques	Jours où le seuil indicatif de risque a été			Réserves de spores au 11/06	Seuil indicatif de risque atteint			Pluies depuis le 04/06
	variété sensible	variété intermédiaire	variété résistante		Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
77-Chailly en Brie	**du 4 au 6 juin**			moyenne	non	non	non	18,9
77-Fay les Nemours	**du 4 au 8 juin**	**du 4 au 8 juin**	**du 4 au 8 juin**	**très importante**	non	oui	oui	2,5
77-Nangis				faible	non	non	non	15,4
78-Boissy sans avoir				faible	non	non	non	18,9
78-Ménerville				faible	non	non	non	30,1
78-Orsonville	**06-juin**			faible	non	non	non	12,6
91-Etampes	**06-juin**			faible	non	non	non	18,4
95-Vémars				faible	non	non	non	23,7
95-Villiers-en-Arthies				faible	non	non	non	28,5

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n'est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d'orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, il ne prend pas en compte l'irrigation, il n'est valable que pour des parcelles non irriguées.

A RETENIR

Risque :
D'après le modèle Mileos, les réserves de spores sont faibles sauf pour les sites de Faÿ-lès-Nemours (77) où elles sont très importantes et de Chailly-en-Brie (77) où elles sont moyennes. Le risque est faible voire nul pour toute la région car pour l'heure les conditions météo ne sont pas propices.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Pour que **le seuil indicatif de risque** soit atteint, il faut que :
- le potentiel de sporulation soit atteint :
Moyen pour les variétés sensibles,
Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires,
Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes,

- et que les conditions météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou supérieures à 15°C pendant 8 heures.

- si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez la fiche "modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre". Elle décrit entre autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV.

MESURES PROPHYLACTIQUES

Consultez le BSV grandes cultures n°14 du 13 mai 2025.

METHODES ALTERNATIVES :

Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / OPUC (fluazinam) EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / RNAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

PUCERON

Cette semaine, tous les sites observés dépassent le seuil indicatif de risque (voir le tableau ci-dessous). **A La Houssaye-en-Brie (77) ainsi qu'à Méréville (91), on notera des infestations très importantes, entre 10 et 50 pucerons par folioles.**

Des auxiliaires sont également présents dans la quasi-totalité des parcelles. Ce sont surtout des coccinelles aux stades adulte et larvaire qui sont notées.

Larve de coccinelles (FREDON Ile de France)

	% de folioles avec pucerons		Auxiliaires
	Semaine 23	Semaine 24	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 à 10 %	**90%**	Coccinelles
77- PUISIEUX	1 à 10%	**70%**	Coccinelles
77-SAINT-SOUPPLETS	11 à 30 %	**95%**	Coccinelles
77- PIERRE-LEVÉE	0%		
95-VILLERON	11 à 30 %	**88%**	Coccinelles
91- LE MÉRÉVILLOIS	31 à 50 %	**90%**	Absence
91-TORFOU	1 à 10 %	**73%**	Coccinelles

Pour avoir des informations sur les pucerons, vous pouvez consulter le BSV grandes cultures n°13 du 07 mai 2025.

Rappel de la méthode de notation :

La notation se fait sur une foliole qui touche la foliole de l'extrémité sur 40 pieds différents pris au hasard en diagonale de la parcelle.

A RETENIR

Risque : très important.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50 % des folioles notées.

Des produits de biocontrôle existent.

DORYPHORE

Cette semaine, les premiers foyers de doryphores ont été observés en parcelle (voir tableau ci-dessous).

	Semaine 23
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
77- PUISIEUX	Quelques adultes
77-SAINT-SOUPPLETS	Absence
95-VILLERON	Quelques adultes
91- LE MÉRÉVILLOIS	Absence
91-TORFOU	Absence

Doryphores et coccinelle (FREDON Ile de France)

Pour en savoir plus sur les doryphores, vous pouvez consulter, le **BSV Grandes cultures n°17 du 29 mai 2025.**

A RETENIR

Risque : faible à modéré. La vigilance est de mise car les conditions météorologiques vont être propices à leur prolifération.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total).

OIGNON

3 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE

STADES

Pour les oignons semis, 3 à 6-7 feuilles.

MALADIES

Mildiou, *Peronospora destructor*

D'après le modèle Miloni de la DGAL, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée cette semaine.

Les sorties de taches de la 3ème génération de mildiou pour la station météorologique de Boissy-sans-Avoir (78) ont bien eu lieu le 5 juin.

	Données du modèle au 03/06/2025			Date prévue de sortie de taches	Risque mildiou	
	Dates des dernières contaminations	Génération	% d'incubation		Oignons bulbilles	oignons semis
Boissy-sans-Avoir - 78	Aucune nouvelle conntamination					
Villenoy - 77	Aucune nouvelle conntamination					
Lumigny - 77	Aucune nouvelle conntamination					
Les Mureaux - 78	Aucune nouvelle conntamination					
Torfou - 91	Aucune nouvelle conntamination					
Vémars -95	Aucune contamination					

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions météorologiques).

A RETENIR

Risque : à ce jour, aucun risque.
En présence de mildiou sporulant en parcelle, le risque est immédiat quelle que soit la génération.
Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.
Seuil indicatif de risque :
Pour les oignons bulbilles, dès la 2ème génération.
Pour les semis, dès la 3ème génération.

Pour avoir des informations sur le cycle du mildiou de l'oignon, consultez le BSV grandes cultures n°13 du 07 mai 2025 et la fiche "Modèle MILONI: Mildiou de l'oignon". Cette dernière informe également des mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement du mildiou.

MESURES PROPHYLACTIQUES

Consultez le BSV grandes cultures n°14 du 13 mai 2025.

METHODES ALTERNATIVES :

Des produits de biocontrôle existent.

RAVAGEURS

• THRIPS - *Thrips tabaci*

Cette semaine, 2 parcelles présentent de faibles infestations de thrips (voir le tableau ci-dessous).
Des piqûres ont également été observées sur 5 % des pieds à Méréville (91) et 70 % à La Houssaye-en-Brie (77).
La semaine dernière, quelques individus avaient été observés à Méréville (91).

	Nombre moyen d'individus/pied
	Semaine 23
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0,35
91- LE MÉRÉVILLOIS	0,1
91-TORFOU	0

Pour avoir plus d'information sur le cycle de développement des doryphores et leur reconnaissance, vous pouvez consulter le BSV grandes cultures n°14 du 13 mai 2025. ou le site Ephytia.

A RETENIR

Risque : faible voire nul. Toutefois, les conditions météorologiques des prochains jours devraient être propices à leur développement.
Stade de sensibilité : dès la levée.
Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

---

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html

Pour en savoir plus sur :

- Les résistances : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/
- Les produits de biocontrôle : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrole-avril-2023-a1709.html
- Les adventices : https://www.infloweb.fr/

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction** :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Clément LECLERCQ, Nicolas GREAUME, Franck GAUDICHAU, Claire TURILLON.
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture** :

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.