

Bulletin de Santé du Végétal

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos



Ile de France

Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 36

07/10/25

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stades 2 feuilles à plus de 10 feuilles vraies. Augmentation de l'activité des grosses altises. Fin progressive du risque piqûres. Augmentation de la présence des pucerons verts mais fin progressive du risque. Forte augmentation des captures de charançons du bourgeon terminal.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 7	mer. 8	jeu. 9	ven. 10	sam. 11	dim. 12	lun. 13
	0	0	0	0	0	0	0
	65 / 100	68 / 100	59 / 98	58 / 100	58 / 100	61 / 100	59 / 100
	8 / 18	10 / 19	10 / 18	7 / 18	8 / 20	8 / 18	8 / 17

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

22 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU


STADES

Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été favorables à une croissance dynamique des colzas.

Les 2 parcelles les plus tardives, semées ou ressemées en septembre, sont aux stades 2 et 3 feuilles vraies.

Les autres parcelles du réseau sont aux stades 4 à plus de 10 feuilles vraies. 36 % des parcelles du réseau ont dépassé le stade de sensibilité aux principaux ravageurs d'automne (7 feuilles vraies).

Répartition des stades (en %)
par semaine d'observation - Automne 2025



RAVAGEURS

Altises des crucifères (petites altises)



Aucune capture cette semaine.

A RETENIR

Risque : fin du risque pour la majorité des parcelles.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.


Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire détruite.

Grosses altises (altises d'hiver)



21 pièges relevés cette semaine, dont 20 capturent au moins un individu.

**Nombre de grosses altises capturées
Réseau BSV Ile de France - Semaine 41 - 2025**




Des captures ont eu lieu sur l'ensemble de la région et certains pièges ont capturé un nombre très important d'individus : 48 individus à Richebourg (78), 25 à Gironville-sur-Essonne (91) et Magny-en-Vexin (95), 22 à Fontenay-Mauvoisin (78).

La fréquence de captures reste très élevée cette semaine (90 %).

L'activité reste bien supérieure à celle de l'année dernière (0,64) ainsi que la moyenne des 10 dernières années (0,8).


**Suivi des fréquences de captures de grosses altises
à l'automne 2025 en région Ile-de-France**



En moyenne 11,3 individus/piège ont été capturés cette semaine. Ce nombre est en forte augmentation par rapport à la semaine dernière (+ 70 %).

La pression est très supérieure à celle observée l'année dernière (2,4 individus/piège à la même période) et supérieure à la moyenne des dix dernières années.

Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2025 en région Ile-de-France



Seules 2 parcelles du réseau sont encore au stade de sensibilité aux morsures d'altises (≤ 3 feuilles) :

- Pézarches (77) : 90 % de plantes porteuses de morsures et 10 % de surface foliaire détruite ;
- Guillerval (91) : 100 % de plantes porteuses de morsures et 50 % de surface foliaire détruite.

Il faut continuer de surveiller les parcelles dont les stades sont hétérogènes.

A RETENIR

Risque : faible à moyen, stade de sensibilité dépassé pour la majorité des parcelles.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds/10 avec morsures et 25 % de surface foliaire détruite.

• Puceron vert du pêcher – *Myzus persicae*



7 signalements cette semaine (45 % des parcelles observées) :

Commune	% plantes avec pucerons	Variété avec résistance TuYV	Stade
Congis-sur-Thérouanne (77)	10 %	HEDEN : résistante	B5
Vallery (89)	10 %	KWS ARIANOS : résistante	B6
Corbreuse (91)	35 %	GENEROSO : résistante	B8
Etampes (91)	5 %	HELYPSE	B8
Gironville-sur-Essonne (91)	50 %	Mélange	B8
Saint-Vrain (91)	15 %	COLLECTOR : non résistante	B7
Magny-en-Vexin (95)	10 %	CEOS : résistante	B5

La résistance variétale au TuYV n'influence pas la colonisation des plantes par les pucerons.

Aucune parcelle du réseau n'est au stade de sensibilité et ne dépasse le seuil indicatif de risque pour une variété non résistante.

La pression est en augmentation par rapport à la semaine dernière : en moyenne 9 % de plantes porteuses d'individus contre 6,5 en moyenne la semaine dernière.

36 % des parcelles du réseau ont dépassé le stade de sensibilité (6 feuilles vraies).

Les conditions climatiques des prochains jours seront favorables à l'activité des pucerons.

• Comment observer ce ravageur ?

En retournant les feuilles et en observant minutieusement la face inférieure.

• Gestion du risque pucerons verts :



La gestion du risque pour ce ravageur est particulière du fait des phénomènes de résistance des populations de pucerons verts aux matières actives de type pyréthrianoïde seul ou en association avec du pyrimicarbe.

L'utilisation de ces matières actives pour gérer le risque pucerons verts s'avère contre-productif épargnant les pucerons résistants et réduisant la régulation naturelle par les auxiliaires. De plus, ces applications spécifiques exerceront une pression de sélection supplémentaire sur les grosses altises et les charançons du bourgeon terminal.

La gestion passe donc par l'utilisation de variétés résistantes à la jaunisse (TuYV) ou par le recours à d'autres solutions de lutte.

- **Liste non exhaustive des variétés résistantes TuYV :**

ADDITION, ATTICA, BLACKBERRY, BRV 703, CEOS, FELICIANO KWS, HEMOTION, HOSTINE, KWS ARIANOS, KWS MIKADOS, KWS PIANO, KWS SANCHOS, LG ACADEMIC, LG ARMADA, LG ATLAS, LG AUSTIN, LG AVIRON, LID INVICTO, RGT OZZONE.

A RETENIR

Risque : faible à moyen.

Stade de sensibilité : de la levée (stade A – cotylédons étalés) au stade 6 feuilles (B6).


Seuil indicatif de risque sur variétés non résistante TuYV : 20 % de plantes porteuses d'au moins un puceron vert.

- **Charançon du bourgeon terminal**




20 pièges ont été relevés cette semaine, dont 35 % ont capturé au moins un individu.

**Nombre de charançons du bourgeon terminal capturés
Réseau BSV Ile de France - Semaine 41 - 2025**



Suivi des captures en cuvette de CBT à l'automne 2025 en région Ile-de-France



Les captures sont en forte augmentation par rapport à la semaine dernière, avec en moyenne 5 individus/piège (pour les pièges ayant capturé au moins un individu).

Cette moyenne est tirée vers le haut par la parcelle d'Etampes (91) qui présente un nombre de captures important avec 25 individus.

Les captures sont bien supérieures à celles de l'automne 2024 ainsi qu'à la moyenne 2014-2024.

Les conditions climatiques des prochains jours seront favorables à l'activité des charançons du bourgeon terminal.

A ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2.5 à 3.5mm) et le charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2,5mm), de couleur gris noirâtre avec le bout des pattes noires.



Terres Inovia a développé un outil de prédiction des vols de charançon du bourgeon terminal :

<https://www.terresinovia.fr/-/outil-prediction-des-vols-de-ravageurs>

A RETENIR

Risque : moyen.

Stade de sensibilité : de la levée (stade A – cotylédons étalés) au stade rosette, 100% des colzas sont au stade de sensibilité.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

- Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>
- Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrrole-avril-2023-a1709.html>
- Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE : Clément LECLERCQ, Nicolas GREAUME, Franck GAUDICHAU, Claire TURILLON.

FREDON Ile-de-France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'agriculture de Région Île-de-France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.