



N° 03

24/02/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stade C1 « reprise de végétation » à D2 « inflorescence principale dégagée ». Quelques captures de charançons de la tige du colza

Blé : 30 % des parcelles sont au stade épi 1 cm.

Orge Hiver : 20 % des parcelles sont au stade épi 1 cm.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 24	mer. 25	jeu. 26	ven. 27	sam. 28	dim. 1	lun. 2
	0	0	0	0.2	1.2	0	0
	62 / 94	53 / 94	66 / 93	64 / 94	59 / 98	63 / 96	59 / 90
	10 / 16	8 / 19	9 / 18	10 / 17	8 / 14	6 / 14	9 / 16

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

14 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

L'ensemble des parcelles du réseau a amorcé la reprise de végétation depuis la semaine dernière. Les parcelles les moins avancées sont au stade C1 « reprise de végétation ».

Les boutons sont accolés (stade D1) dans 50 % des parcelles. Les parcelles les plus avancées sont au stade D2 « inflorescence principale dégagée ».

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.


Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Répartition des stades (%) par semaine d'observation dans le réseau BSV IDF - printemps 2026



C1 – reprise de végétation
apparition de jeunes feuilles dans le cœur de rosette, sans élongation de la tige



C2-début montaison
Apparition des entre-nœuds, les pétioles de la rosette s'écartent les uns des autres



Stade D1
boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales



Stade D2
Inflorescence principale dégagée, inflorescences secondaires visibles



RAVAGEURS

Charançon de la tige du colza




Le charançon de la tige du colza est le premier ravageur à surveiller en sortie d'hiver.

Les insectes quittent les parcelles de colza de l'année précédente, dès que la température de l'air dépasse les 9°C.

Lorsque la température atteint 12 à 13 °C, le nombre de charançons pouvant se déplacer peut-être important. Dans tous les cas, les insectes migrent vers le champ de colza le plus proche, se posant rapidement avant de se répartir dans la parcelle. Les prévisions météo à venir avec des minimales autour de 9 °C seront donc favorables aux déplacements de ces insectes.

Cette semaine, 5 parcelles sur les 14 observées capturent au moins un charançon de la tige du colza soit 35,7 % des parcelles observées, avec en moyenne 2,6 individus lorsque l'insecte est présent dans la parcelle.

Evolution des captures moyennes de charançons de la tige du colza au printemps 2026



A ne pas confondre avec le charançon de la tige du chou, qui est peu à pas nuisible en région.


Le charançon de la tige du chou

Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.



Le charançon de la tige du colza

C'est le plus gros, son corps est gris cendré, avec le bout des pattes noires.



Terres Inovia a développé un outil de prédiction des vols de charançon de la tige du colza :

<https://www.terresinovia.fr/-/outil-prediction-des-vols-de-ravageurs>

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : du stade C2 (entre-nœuds visibles) au stade E (boutons séparés).

Seuil indicatif de risque : il n'y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 jours après les premières captures significatives dans la parcelle, lorsque les femelles commencent à être apte à pondre dans les tiges.

• Cylindrosporiose

Seule la parcelle de Mondeville (91) signale 10 % de plantes avec symptômes.

Symptômes source Terre INOVIA :

- **Plage de décoloration légère (bleuté, vert pâle)**
- **Localisation où l'eau stagne sur le limbe**
- **Tache beige à fauve de type « brûlures » à aspect liégeux, tissu cassant**
- **Présences, d'acervules (pustules blanches) autour de la tache.**




Photo : Terres Inovia

Il n'existe pas de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en région Ile-de-France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l'approche de la floraison ou à partir du moment où la protection contre le sclérotinia intervient.

Exemples de variétés et sensibilité aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles dans le réseau Ile-de-France :

BLACKJACK : assez sensible (1 parcelle)

BLACKPANTHER : assez sensible (1 parcelle)

CEOS : peu sensible (4 parcelles)

COLLECTOR : pas d'infos (1 parcelle)

GENEROSO : peu sensible (1 parcelle)

HEDEN : peu sensible (1 parcelle)

KWS ARIANOS : peu sensible (1 parcelle)


KWS DOMINGOS : peu sensible (1 parcelle)

KWS FELICIANO : peu sensible (1 parcelle)

BLE

17 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES




Pour rappel :

Le stade épi 1 cm est atteint lorsque la distance entre la base du plateau de tallage et le sommet de l'épi est de 1 cm, ceci pour plus de 50 % des maîtres-brins.

Cette semaine sur le réseau BSV, nous pouvons observer que la grande majorité des parcelles (59 %) sont au stade fin tallage – début redressement.


Nous pouvons aussi remarquer que 29 % des parcelles du réseau sont au stade Z30 (épi 1 cm). Les variétés concernées sont PONDOR, SHREK, KWS PERCEPTIUM, CHEVIGNON et RGT PACTEO : toutes semées entre le 03/10/2025 et le 15/10/2025.



ORGE D'HIVER

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES





Comme en témoigne le graphique ci-dessus, 70 % des parcelles du réseau sont au stade fin tallage et 20 % atteignent le stade Z30 (épi 1 cm).

Les parcelles au stade épi 1 cm sont situées à Cerneux (77) (variété KWS FARO semée le 02/10/2025) et à Guillerval (91) (variété CAROUSSEL semée le 15/10/2025).

MALADIES

Rappel des périodes de sensibilité des maladies sur blé (Source Arvalis) :





Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

• **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.

• **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Franck GAUDICHAU, Nicolas GREAUME, Mathilde GUILLOUX, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

• **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.