



Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 26

04/08/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Betterave : en raison de la sécheresse qui perdure, moins de 60 % des parcelles des betteraves ne couvrent plus le sol. Il est difficile d'estimer la jaunisse. Situation plutôt stable en cercosporiose. En revanche, hausse importante du rhizopus à la suite de la présence de lixus.

Maïs : majorité des parcelles à grains laiteux pâteux. Pas de pucerons, fin du 1er vol des papillons de pyrale, pas de sésamie.

Pomme de terre : aucun risque mildiou n'est prévu pour les prochains jours. Des doryphores et des cicadelles sont toujours observés ainsi que des symptômes d'alternariose.

Oignon : le risque mildiou à venir est faible voire nul. La pression en thrips reste élevée. Des galeries de mouches mineuses ainsi que des symptômes de botrytis squamosa sont toujours observés.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 4	mer. 5	jeu. 6	ven. 7	sam. 8	dim. 9	lun. 10
	0	0	0	0	0	1.9	0
	27 / 76	33 / 84	30 / 74	24 / 76	18 / 65	48 / 84	36 / 84
	23 / 32	19 / 27	16 / 25	12 / 26	13 / 30	16 / 27	16 / 26

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

BETTERAVE

26 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

La perte en feuillage continue de baisser sur l'ensemble du réseau. Il y a moins de 60 % des parcelles à 100 % de couverture, et 30 % du réseau sont tout juste à 50 % de couverture.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.


Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



RAVAGEURS

• Jaunisse

Sur les 7 parcelles dont des informations sur la jaunisse sont renseignées, toutes présentent des symptômes, allant de quelques betteraves isolées touchées à 10 % de la surface (Boissy-sans-Avoir, 78).


Néanmoins, avec la sécheresse actuelle, il devient difficile d'observer les symptômes de jaunisse.

• Teignes



Sur 4 pièges relevés cette semaine, tous remontent la présence de papillons avec 37 papillons piégés en moyenne. Il y a de grandes différences de captures, avec seulement 8 papillons capturés à d'Huisson-Longueville (91) contre 95 à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78).

Parmi les 17 parcelles renseignées, 12 parcelles présentent des dégâts frais dont 9 parcelles au-dessus du seuil de risque. A noter, les parcelles à Thorigny-sur-Oreuse dans l'Yonne et de Noisy-Rudignon en Seine-et-Marne ont 80 % de betteraves avec des dégâts de teignes.



A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Pégomyies



Sur 16 parcelles renseignées, 4 parcelles remontent de 2 à 15 % de betteraves touchées.


A RETENIR

Risque : faible.


Stade de sensibilité : toute la période de végétation.

Seuil indicatif de risque : avant couverture du sol : 10 % de plantes avec au moins 1 galerie.
après couverture du sol : 50 % de plantes avec au moins 1 galerie ou présence d'asticots.

• Noctuelles



17 parcelles du réseau remontent la présence de dégâts de noctuelles, allant de 1 à 56 % de betteraves touchées (D'Huisson-Longueville, 91).



A RETENIR

Risque : faible en culture irriguée.
moyen en culture sèche.

Stade de sensibilité : de 6 feuilles à la récolte.

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections récentes.

• Charançon



Parmi les 14 parcelles renseignées, 11 d'entre elles ont des trous de pontes, avec en moyenne, 48 % de betteraves touchées (de 5 à 100 % de betteraves touchées) et 2 parcelles avec toutes les betteraves impactées.

Cette semaine, 11 parcelles renseignent des informations sur le rhizopus, toutes avec des betteraves mortes. A noter que la parcelle de Thorigny-sur-Oreuse (89) a 40 % de betteraves avec du rhizopus.




Parcelle sud Seine-et-Marne avec presque 40 % de betteraves pourries en raison du rhizopus.


MALADIES DU FEUILLAGE

24 parcelles renseignées

• Cercosporiose



Une carte interactive sur le site de l'ITB permet de consulter le statut des parcelles par seuil de traitement <https://alerte.itbfr.org/maladies/>.



Presque la moitié des parcelles renseignées est encore dépourvue de cercosporiose, une seule est au seuil du T1, aucune parcelle sous protection du T1 et 13 parcelles sous le seuil du T2.

Les conditions les plus favorables pour la sporulation des conidies et l'infection de l'hôte sont une température comprise entre 27 °C et 32 °C ainsi qu'une humidité relative à la surface des feuilles supérieure à 90 % pendant 5 à 8 heures. Aucune sporulation n'a lieu à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 38 °C.

• Rouille et oïdium



Une seule parcelle remonte 60 % des betteraves avec de l'oïdium à Puiseux-Pontoise (95). Une seule parcelle indique 1 % de betteraves avec de la rouille (Soisy-sur-Ecole, 91).

Les conditions météorologiques **actuelles et à venir** sont défavorables à l'évolution de la rouille. L'optimum thermique de ce champignon est relativement bas (14 °C).

A RETENIR

Risque : moyen pour la cercosporiose.

faible pour la rouille, l'oïdium et la ramulariose.

Stade de sensibilité : dès la couverture.

Seuil indicatif de risque : début de la protection avant la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	1ers symptômes	20%	25%
Ramulariose	5%	20%	25%
Oïdium	15%	30%	30%
Rouille	15%	40%	40%

MAÏS

11 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Floraison + 15 jours à 50 % humidité du grain en parcelle irriguée. La majorité des parcelles sont au stade grains laiteux pâteux.

RAVAGEURS

• Pucerons



Pas de puceron observé cette semaine.

Pucerons (Source : CARIDF, Arvalis)	Seuil d'intervention
 <i>Metopolophium dirhodum</i>	Avant 3 et 4 feuilles : 5 pucerons/plante Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons/plante Entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons/plante Entre 8 et 10 feuilles : 100 pucerons/plante Après 10 feuilles : + 100 pucerons/plante
 <i>Sitobium avenae</i>	Entre 3 et 10 feuilles : 500 pucerons/plante ou production de miellat sur les feuilles à proximité de l'épi Après 10 feuilles : plusieurs centaines de pucerons/plante
 <i>Rhopalosiphum padi</i>	Arrivée possible dès 5-6 feuilles Quand quelques panicules sont touchées par les premiers pucerons, observer tous les jours les parcelles et intervenir si les populations se développent, surtout si les auxiliaires sont peu nombreux.

A RETENIR

Risque : faible.


Stade de sensibilité : voir tableau.

Seuil indicatif de risque : voir tableau.

• Pyrales



9 parcelles ne capturent pas de papillons. Les deux parcelles qui capturent se situent dans le val d'Oise avec 2 et 5 papillons. Le risque diminue avec les conditions climatiques très chaudes car les pontes se dessèchent et se décollent. Un deuxième vol sera possible en août si l'été reste chaud comme en 2025.



A RETENIR

Risque : faible

Stade de sensibilité : 10-12 feuilles à floraison.

• Sésamie



Pas de sésamie dans les parcelles observées cette semaine.

POMME DE TERRE

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Début sénescence à 50 % sénescence.

MALADIES

• Mildiou - *Phytophthora infestans*



Aucun risque n'a été enregistré la semaine dernière sur les différents postes météorologiques de la région, d'après le modèle Mileos®.

Malgré les conditions météorologiques actuelles favorables au développement du mildiou pour les postes de Nangis (77) et de Chailly-en-Brie (77), les réserves de spores étant faibles au 4 août (et pour les trois jours à venir) pour l'ensemble des postes, aucun risque n'est prévu. Pour le reste des stations météorologiques, le risque est aussi nul.

Dans la majorité des sites suivis, des symptômes de mildiou non sporulants sont toujours observés.

Situation au 4 août :

Stations météorologiques	Jours où le seuil indicatif de risque a été atteint			Réserves de spores au 04/08 à 8h00	Seuil indicatif de risque atteint			Pluies depuis le 28/07
	Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante		Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
77-Chailly-en-Brie				faible	non	non	non	9,2
77-Faÿ-Lès-Nemours				faible	non	non	non	0
77-Nangis				faible	non	non	non	0
78-Boissy-sans-Avoir				faible	non	non	non	0,8
78-Ménerville				faible	non	non	non	2
91-Etampes				faible	non	non	non	3,3
95-Vémaris				faible	non	non	non	1,7
95-Villiers-en-Arthies				faible	non	non	non	0

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n'est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d'orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, il ne prend pas en compte l'irrigation, il n'est valable que pour des parcelles non irriguées.

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement. La protection doit se maintenir même après le défanage.

Pour connaître la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre, vous pouvez consulter le site du [Plant français de la pomme de terre dans la rubrique variétés](#).

A RETENIR

Risque : aucun risque de contamination n'est prévu, quelle que soit la sensibilité variétale.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Le seuil indicatif de risque :

Pour que le seuil soit atteint, il faut d'une part, que le potentiel de sporulation soit atteint :

Moyen pour les variétés sensibles,

Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires,

Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes,

et d'autre part que les conditions météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21 °C durant 6 heures consécutives ou supérieures à 15 °C pendant 8 heures.

Si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez la fiche "[modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre](#)". Elle décrit entre autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mildiou / pomme de terre / OPUC (fluazinam) est exposé à un risque de résistance.

Le groupe mildiou / pomme de terre / RAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) est exposé à un risque de résistance.

• Alternaria, Alternaria solani



Quelques feuilles présentent toujours des symptômes d'alternariose à La Houssaye-en-Brie (77).

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°17 du 3 juin 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

RAVAGEURS

• Pucerons



Comme lors des relevés précédents, aucun puceron n'est observé cette semaine, dans l'ensemble des sites suivis.

Des coccinelles et araignées auxiliaires sont observées à La Houssaye-en-Brie (77) et Saint-Soupplets (77).

Pour avoir des informations sur les pucerons et les virus, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste faible.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50 % des folioles notées.

• Doryphores



Les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et de Villeron (95) présentent des individus adultes. La semaine dernière, seule la parcelle à Villeron (95) était touchée (cf. tableau ci-dessous).

	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
77-SAINT-SOUPPLETS	Absence	Absence	Absence
77-POINCY	Quelques adultes	Absence	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	Absence	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
91-ANGERVILLE	Absence	Absence	Absence
95-VILLERON	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total).

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• Cicadelles

Des cicadelles sont toujours observées sur les sites de Saint-Soupplets (77), La Houssaye-en-Brie (77) et Villeron (95). Des piqûres sont aussi observées sur ces mêmes sites (cf. tableau ci-dessous).



	Semaine 31	Semaine 32
77-SAINT-SOUPPLETS	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres
77-POINCY	Présence d'adultes et de piqûres	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres
91-ANGERVILLE	Absence	Absence
95-VILLERON	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°17 du 3 juin 2026](#).

OIGNON

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Pour les oignons semis, bulbe ayant atteint 70 % de sa taille finale.

MALADIES

• Mildiou, *Peronospora destructor*



Pour l'ensemble des postes météorologiques, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée depuis la semaine dernière, d'après le modèle Miloni de la DGAL.

	Données du modèle au 04/08/2026			Date prévue de sortie de taches	Risque mildiou	
	Dates des dernières contaminations	Génération	% d'incubation		Oignons bulbilles	Oignons semis
78-Boissy-sans-Avoir	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
78-Les Mureaux	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Villeny	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Lumigny	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
91-Torfol	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
95-Vémar	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions météorologiques).

Attention, le modèle ne prend pas en compte l'irrigation des parcelles, le risque peut être dans ce cas-là plus important.

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul pour l'ensemble des secteurs.

Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.

Seuil indicatif de risque :

pour les oignons bulbilles, dès la 2^{ème} génération.

pour les semis, dès la 3^{ème} génération.

Pour avoir des informations sur le cycle du mildiou de l'oignon, consultez le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#) et la fiche "[Modèle MILONI : Mildiou de l'oignon](#)". Cette dernière informe également des mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement du mildiou.

• Botrytis Squamosa



Cette semaine, 5 % des plantes présentent des symptômes de botrytis à Torfou (91) et La Houssaye-en-Brie (77). Aucun symptôme n'avait été observé lors des relevés précédents.



Fredon Ile de France

A RETENIR

Risque : le risque augmente et devient faible à modéré.

Pour obtenir davantage d'informations sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°13 du 30 juin 2026](#).

RAVAGEURS

• Thrips, Thrips tabaci



La pression des thrips reste élevée cette semaine avec l'ensemble des sites suivis présentant des infestations de thrips (cf. tableau ci-dessous). Le seuil de risque est toujours dépassé à La Houssaye-en-Brie (77).

Des thrips auxiliaires (*Aeolothrips intermedius*) sont également observés sur ces différentes parcelles.

	Semaine 31			Semaine 32		
	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence
77-POINCY	45 %	0,7	35 %	45 %	0,8	25 %
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	75 %	7,2	35 %	70 %	3,8	40 %
91-TORFOU	20 %	0,2	10 %	10 %	0,1	10 %
91-ANGERVILLE	10 %	0,2	0 %	10 %	0,4	5 %

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste modéré à important. Les conditions météorologiques continueront d'être propices à leur développement dans les prochains jours.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

• Mouches mineuses, *Lyriomyza cepae*



Des galeries de mouches mineuses (*Lyriomyza cepae*) sont observées cette semaine à Torfou (91) et Poincy (77), sur 5 % des plantes.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°18 du 10 juin 2026](#).



Mines sur oignon
(FREDON Ile de France)

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrrole-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.