



Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 36

13/10/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stade cotylédons à 7 feuilles vraies. Augmentation des captures de grosses altises. Augmentation des symptômes de morsures de petites et grosses altises. Pas de dégâts de limaces. Stabilisation de la pression pucerons verts.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 13	mer. 14	jeu. 15	ven. 16	sam. 17	dim. 18	lun. 19
	0	0	0	0.5	0.2	0	0
	53 / 85	54 / 91	45 / 89	60 / 97	53 / 100	53 / 100	57 / 100
	14 / 24	10 / 20	8 / 24	10 / 21	8 / 17	7 / 15	6 / 15

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

18 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU


STADES

Les colzas évoluent lentement et les écarts se creusent entre les parcelles. Au sein des parcelles, les stades sont très hétérogènes avec des colzas au stade cotylédons et d'autres au stade 4 feuilles.

Plusieurs parcelles du réseau ont été ressemées partiellement afin de compenser le manque de pieds.

Les parcelles les moins avancées sont au stade cotylédons, les plus avancées au stade 7 feuilles vraies.

Répartition des stades (en %)
par semaine d'observation - Automne 2026



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

RAVAGEURS

Altises des crucifères (petites altises)



Des individus ont été capturés dans une seule parcelle du réseau cette semaine :

- 3 à Videlles (91).


A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

Grosses altises (altises d'hiver)




17 parcelles observées cette semaine. La fréquence de capture est en augmentation par rapport à la semaine dernière (+ 10 %). Elle est plus importante par rapport à la moyenne des 10 dernières années.



Source : CARIDF


Suivi des fréquences de captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




La pression diminue par rapport à la semaine dernière, avec en moyenne 17,8 individus capturés par piège.

50 % des parcelles capturent 10 individus ou plus.

Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




Piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaître le début du vol. Venez observer 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de levée.



Des morsures d'altises (des crucifères et des altises d'hiver confondues) sont observées dans l'ensemble des parcelles observées (11 au total). **44 % des parcelles du réseau sont au stade de sensibilité** aux morsures d'altises.

La pression est en augmentation par rapport à la semaine dernière. En moyenne, 75 % des plantes présentent des morsures. La surface foliaire détruite est également en hausse, avec 27,1 % de la surface affectée en moyenne, contre 15,6 % la semaine dernière.

La pression observée est très supérieure à la moyenne des 10 dernières années avec des colzas moins développés.



A RETENIR

Risque : moyen, sortie progressive des parcelles du stade de sensibilité.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

• Limaces



Il n'y a pas de signalement de dégâts de limaces cette semaine.

Il est nécessaire de surveiller le risque à la parcelle. Le risque est plus important dans les parcelles avec de nombreux résidus de pailles et/ou avec une préparation de sol motteuse.

Piégeage :

Vous pouvez disposer 4 bâches de 0,25 m² bien humidifiées et maintenues au sol. Les pièges sont installés le soir pour un relevé le lendemain matin de bonne heure. La localisation des pièges devra être modifiée à chaque relevé.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l'activité des limaces.

• Pucerons verts



Les signalements sont stables par rapport à la semaine dernière. Des pucerons verts ont été observés dans 75 % des parcelles du réseau (12 observées) :

Commune	Variété / tolérance TuYV	% de plantes avec individus
Abbéville-la-Rivière (91)	Mélange : non tolérantes	15 %
Attainville (95)	KWS DOMINGOS : tolérante	100 %
Egreville (77)	KWS DOMINGOS : tolérante	0 %
Gironville-sur-Essonne (91)	Mélange : non tolérantes	0 %
Leudeville (91)	COLLECTOR : non tolérante	15 %
Méroberty (91)	HECLAIR : non tolérante	0 %
Mondreville (91)	HEDEN : tolérante	2 %
Saint-Germain-Laxis (77)	HELYPSE : non tolérante	2 %
Saint-Illiers-la-Ville (78)	Mélange : tolérantes	3 %
Saint-Martin-de-Bréthencourt (78)	Mélange : tolérantes	75 %
Vallangoujard (95)	KWS DOMINGOS : tolérante	100 %
Videlles (91)	CEOS : tolérante	28 %

93 % des parcelles sont au stade de sensibilité (≤ 6 feuilles vraies).

Le seuil indicatif de risque pour les variétés non tolérantes n'est pas dépassé cette semaine.

- **Comment observer ce ravageur ?**

En retournant les feuilles et en observant minutieusement la face inférieure.

A RETENIR

Risque : moyen.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque sur variétés non résistantes TuYV : 20 % de plantes porteuses d'au moins un puceron vert.

- **Charançon du bourgeon terminal**



2 parcelles ont capturé chacune un individu : Abbéville-la-Rivière (91) et Saint-Illiers-la-Ville (78).

A ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2,5 à 3,5 mm) et le charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2,5 mm), de couleur gris noirâtre avec le bout des pattes noir.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée (stade A cotylédons étalés) au stade rosette, 100 % des parcelles de colza sont au stade sensible.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.