Bulletin de Santé du végétal



Ile de France

Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 42
24/11/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stade 4 feuilles à plus de 10 feuilles vraies. Diminution des captures d'insectes (grosses altises, charançons du bourgeon terminal). Augmentation du nombre de larves d'altises.

Blé : levée à début tallage.

Orge d'hiver : 2ème feuille étalée à début tallage.

Céréales d'hiver : diminution des observations de pucerons (conditions moins favorables à l'observation cette semaine). Piégeage de cicadelles en diminution. Vigilance limaces, quelques dégâts sont observés.

Campagnol des champs : peu de dégâts de campagnols relevés.

METEO

STATION DE LIEUSAINT (77)

	mar. 24	mer. 25	jeu. 26	ven. 27	sam. 28	dim. 29	lun. 30
	0	7.2	0	0	0	0.2	0
%	89 / 94	93 / 99	73 / 99	58 / 85	60 / 75	71 / 97	72 / 93
	3 / 8	4 / 9	-1 / 4	-1 / 3	-1 / 4	2 / 7	3 / 6

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

18 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Il y a peu d'évolution des stades avec les conditions climatiques du moment.


Les parcelles les moins avancées sont toujours au stade 4 feuilles étalées tandis que les plus avancées sont au stade plus de 10 feuilles vraies.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos




RAVAGEURS

RISQUE FAIBLE — RISQUE FORT

• Grosses altises (altises d'hiver)




16 parcelles observées cette semaine. La fréquence de capture diminue fortement par rapport à la semaine dernière. Néanmoins, elle reste supérieure à celle observée l'an dernier ainsi qu'à la moyenne enregistrée au cours des dix dernières années.



L'activité traduite par les captures diminue par rapport à la semaine dernière, avec en moyenne 1,5 individus capturés par piège. Elle reste supérieure à l'année passée et à la moyenne des 10 dernières années.
L'ensemble des parcelles observées sont sorties du stade de sensibilité concernant les adultes de grosses altises.

Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2026
en région Ile-de-France



A RETENIR

Risque : faible, sortie des parcelles du stade de sensibilité.
Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.
Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures **et** 25 % de surface foliaire atteinte.

• Larves de grosse altises (altises d'hiver)



12 parcelles ont été observées pour ce paramètre cette semaine, 8 d'entre elles signalent des larves sur plante :

Commune	% plantes avec au moins une larve
Attainville (95)	0 %
Vallangoujard (95)	100 %
Chenoise-Cucharmoy (77)	50 %
Égreville (77)	0 %
Cerneux (77)	0 %
Villiers-Saint-Frédéric (78)	40 %
Mondreville (78)	15 %
Saint-Illiers-la-Ville (78)	100 %
Saint-Martin-de-Bréthencourt (78)	30 %
Etampes (91)	0 %
Gironville-sur-Essonne (91)	80 %
Leudeville (91)	40 %

La fréquence d'observation est inférieure cette année par rapport à l'année dernière, où 77 % des parcelles remontaient des observations de larves d'altises (67 % cette année).

En moyenne, 57 % des pieds sont porteurs d'au moins une larve (pour les parcelles ayant été observées avec des larves). La pression est plus importante que l'année dernière à la même période : en 2025, en moyenne 49 % des plantes étaient porteuses d'au moins une larve.
Parmi les parcelles, 25 % d'entre-elles dépassent le seuil indicatif de risque (70 % des plantes avec au moins une galerie) :

- Saint-Illiers-la-Ville (78) : 100 % des plantes avec au moins une galerie,
- Vallangoujard (95) : 100 % des plantes avec au moins une galerie,
- Gironville-sur-Essonne (91) : 80 % des plantes avec au moins une galerie.


Des tests Berlèses ont été réalisés pour 4 parcelles. Nous observons en moyenne 3,9 larves/pieds. Le seuil indicatif de risque est dépassé dans 50 % des cas (2 parcelles) :

- Saint-Germain-Laxis (77) : 2 larves/pied,
- Saint-Illiers-la-Ville (78) : 11 larves/pied.

La période de surveillance est en cours, mais soyez prudent sur la bonne identification des larves (confusions possibles avec d'autres larves, voir ci-dessous) et attendre le seuil indicatif de risque avant d'intervenir.

Un diagnostic optimal s'effectue à l'échelle parcellaire.

Les larves L1 (premier stade) mesurent 1,2 à 2,5 mm, elles ont un corps blanc translucide avec une pigmentation brun-noir et ont les extrémités du corps de couleur brun foncé à noir. **Parmi les larves d'insectes que l'on retrouve dans les pétioles des feuilles, seules les larves d'altises possèdent des pattes.**



Méthode d'observation :

Prélever une vingtaine de plantes dans plusieurs endroits de la parcelle. Rechercher d'abord s'il y a des orifices ou des galeries sur les pétioles. Si c'est le cas, couper longitudinalement les pétioles et observer, de préférence avec une bonne loupe, si des larves y sont logées (illustration ci-dessus).

Simulation des larves d'altises :

Le modèle de Terres Inovia permet de simuler les dates de pontes et les différents stades larvaires selon la date de début des vols de grosses altises adultes. Ces dates sont obtenues à partir des données météorologiques réelles de l'année, au jour de la simulation, complétées par les valeurs normales.

Le pic de vol a eu lieu aux alentours du 7 octobre.

Ci-dessous les simulations par secteur des dates d'éclosion et de mue en fonction des dates d'arrivée :

Station Météo France	Date début d'activité	Eclosion L1	Mue L2	Mue L3
CHEVRU 77	20/09	**7-oct.**	**15-oct.**	**27-oct.**
	25/09	**15-oct.**	**27-oct.**	**20-nov.**
	1/10	**11-nov.**	**1-janv.**	**17-mars**
	5/10	**23-déc.**	**13-mars**	**1-avr.**
LA BROSSE MONTCEAUX 77	20/09	**6-oct.**	**13-oct.**	**22-oct.**
	25/09	**13-oct.**	**22-oct.**	**10-nov.**
	1/10	**27-oct.**	**18-nov.**	**31-déc.**
	5/10	**17-nov.**	**28-déc.**	**25-févr.**
TOUSSU LE NOBLE 78	20/09	**8-oct.**	**15-oct.**	**26-oct.**
	25/09	**15-oct.**	**26-oct.**	**19-nov.**
	1/10	**10-nov.**	**23-déc.**	**4-mars**
	5/10	**10-déc.**	**26-févr.**	**23-mars**
BOIGNEVILLE 91	20/09	**8-oct.**	**15-oct.**	**27-oct.**
	25/09	**15-oct.**	**27-oct.**	**19-nov.**
	1/10	**10-nov.**	**18-déc.**	**4-mars**
	5/10	**7-déc.**	**24-févr.**	**22-mars**
PONTOISE AERODROME 95	20/09	**10-oct.**	**16-oct.**	**28-oct.**
	25/09	**16-oct.**	**27-oct.**	**21-nov.**
	1/10	**12-nov.**	**23-déc.**	**19-févr.**
	5/10	**14-déc.**	**7-févr.**	**14-mars**

Simulation données T°C réelles jusqu'au 22/11/2026, prévision météo jusqu'au 30/11/2026 puis relais à partir des données médianes journalières 2006-2025.

A RETENIR

Risque : moyen

Stade de sensibilité : du stade rosette au décollement du bourgeon terminal.


Seuil indicatif de risque : 70 % de plantes avec au moins une galerie au stade rosette ou 2-3 larves par plante en moyenne (test Berlèse).

BLE TENDRE

16 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

16 parcelles observées cette semaine pour des dates de semis s'étalant du 02/10 au 31/10.
En absence d'observations sur les semis les plus tardifs, 50 % des blés sont soit au stade 2ème feuille étalée soit au stade 3ème feuille étalée à début tallage.




ORGE D'HIVER

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

10 parcelles observées cette semaine pour des dates de semis comprises entre le 05/10 et le 27/10.
Comme pour les blés, les orges d'hiver sont entre le stade 2ème feuille étalée à début tallage.



CEREALES D'HIVER

RAVAGEURS

- **Cicadelles**



Sur 19 pièges, 3 seulement ont capturé des individus avec une moyenne de 0,26 captures par piège en une semaine.
Le nombre d'individus capturés et la fréquence de piégeage est en forte diminution.
Sur les 3 pièges, les captures sont très faibles avec 1, 2 et 2 individus piégés.

A RETENIR

Facteurs de risque :
Semis précoce et à faible densité,
Des températures douces supérieures à 12 °C,
Des parcelles ensoleillées, se réchauffant vite et à l'abri du vent (proches d'un bois, d'une haie),
Proximité des parcelles avec des repousses de céréales et des graminées adventices.

Stade de sensibilité : de levée jusqu'à 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque :
Si < 30 captures hebdomadaires de cicadelles, risque de dégâts nul,
Si entre 30 et 100 captures hebdomadaires, risque modéré,
Si > 100 captures hebdomadaires, risque fort de dégâts.

• Pucerons



Présence des pucerons en céréales			
	SEM 46	SEM 47	**SEM 48**
nombre d'observations	27	23	**25**
%parcelles indemnes	63	78	**96**
%parcelles avec infestation <10% et -10j	26	0	**0**
%parcelles avec infestation >10%	0	9	**4**
%parcelle avec infestation <10% et +10j	11	13	**0**

Cette semaine, 96 % des parcelles sont indemnes de pucerons. Très forte baisse des observations depuis deux semaines.
Une seule parcelle d'orge d'hiver située à Mareil-le-Guyon (78) signale 2 % de pieds porteurs de pucerons et dépasse le seuil de présence de plus de 10 jours.

A RETENIR

Facteurs de risque :
Semis précoce et à faible densité,
Des températures douces supérieures à 12 °C,
Vent pour la dissémination,
Proximité d'une jachère, de repousses de céréales, de parcelles de maïs.

Stade de sensibilité : de levée jusqu'à fin tallage.

Seuil indicatif de risque :
10 % de plantes infestées ou quand leur présence se prolonge sur la culture pendant au moins 10 jours, et ce quel que soit leur nombre.

• Limaces



Sur 23 parcelles observées, 8 sont touchées soit 34,8 % des parcelles.
En moyenne, il y a 1 % des plantes touchées par des dégâts de limaces.

La vigilance est de mise avec les conditions climatiques actuelles.

CAMPAGNOL

1 parcelle du réseau + 28 parcelles flottantes observées dans le réseau cette semaine

Parmi les 29 parcelles suivies cette semaine, 17 sont indemnes de dégâts de campagnol des champs. Des dégâts inférieurs à 20 % sont signalés sur une parcelle, tandis que sur les autres parcelles, l'activité se limite à la présence d'indices dans les accotements.
Dans l'ensemble, les parcelles de colza demeurent peu touchées par les campagnols. Pour les céréales, les stades de développement peu avancés ne permettent pas toujours de mettre en évidence leur présence au sein des parcelles, d'autant plus lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un travail du sol avant l'implantation de la culture.



Les conditions météorologiques observées en 2026 en Île-de-France, caractérisées par des températures élevées, un déficit pluviométrique marqué au printemps et une sécheresse précoce des sols, ont été peu favorables au développement des populations de campagnols. L'assèchement de la végétation et la moindre disponibilité des ressources alimentaires peuvent limiter leur activité et leur reproduction.

CULTURE	LIEU	SEMAINE 48
Blé	77-CHAMPEAU	Absence de dégâts
	77-LES MARÊTS	Absence de dégâts
	77-NANGIS	Absence de dégâts
	77-ROUVRAY	Indices présents dans l'accotement
	91-ARRANCOURT	Absence de dégâts
	91-LE PLESSIS-SAINT-BENOIST	Indices présents dans l'accotement
	91-THIONVILLE	Indices présents dans l'accotement
	91-VILLENEUVE-SUR-AUVERS	Absence de dégâts
Chaumes de blé	91-LA FORET-LE-ROI	Indices présents dans l'accotement
Colza	77-ANDREZEL	Indices présents dans l'accotement
	77-BEAUVOIR	Absence de dégâts
	77-CLOS-FONTAINE	Absence de dégâts
	77-COURPALAY	Absence de dégâts
	77-GASTINS	Absence de dégâts
	77-MOISENAY	Indices présents dans l'accotement
	77-MORMANT	Absence de dégâts
	77-NANGIS	Indices présents dans l'accotement
	77-SAINT GERMIAN-LAXIS	Absence de dégâts
	91-LA FORET-SAINTE-CROIX	Indices présents dans l'accotement
	91-LE MEREVILLOIS	Absence de dégâts
	91-LES GRANGES-LE-ROI	Indices présents dans l'accotement
	91-MEROBERT	Absence de dégâts
	91-MORIGNY-CHAMPIGNY	Absence de dégâts
	91-PUSSAY	Indices présents dans l'accotement
	91-RICHARVILLE	Absence de dégâts
Moutarde	77-LA CHAPELLE-IGER	Indices présents dans l'accotement
Orge d'hiver	77-VOISENON	Absence de dégâts
Jachère	91-LE PLESSIS-SAINT-BENOIST	Quelques dégâts mais inférieurs à 20 %
repousses céréales	91-CERNY	Indices présents dans l'accotement

METHODES ALTERNATIVES

Pour limiter le développement de ce ravageur, il faut favoriser le travail du sol en insistant sur les zones sensibles de la parcelle (« bordures »).

La pose de perchoirs à rapaces à proximité des parcelles concernées est une méthode alternative la plus efficace (pour plus d'informations, consulter le **BSV grandes cultures n°33 du 22 septembre 2026**).

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html,
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/

-Les produits de biocontrôle : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrole-avril-2023-a1709.html

-Les adventices : https://www.infloweb.fr/

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOPERATIVE DE BETON BAZOCHES, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction** :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Franck GAUDICHAU, Nicolas GREAUME, Mathilde GUILLOUX, Clément LECLERCQ, Marie BOULARD.
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture** :

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.