



N° 09
10/07/26

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles		Présences généralisées

Photos EL Conseil Horticole sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

22 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

	ven. 10	sam. 11	dim. 12	lun. 13	mar. 14	mer. 15	jeu. 16
	0	0	0	0	1.1	2.3	6.9
	22 / 63	16 / 50	19 / 51	15 / 42	24 / 43	23 / 55	41 / 73
	21 / 35	22 / 36	22 / 37	22 / 37	23 / 34	23 / 37	22 / 33

Climatologie : températures très chaudes, caniculaires sur ce début juillet. Un orage avec pluie, grêle violente et vent a traversé les Yvelines et le Val-d'Oise sur une bande assez étroite. Des températures à nouveau très élevées annoncées pour les jours à venir. La végétation souffre.

Ravageurs : populations plutôt faibles, attention tout de même à la présence d'acariens, dont le climat favorise la pullulation des tétranyques, et attention à la possible montée en présence des thrips : mis en difficultés au-delà de 30 degrés, ils restent dans une gamme de températures où les cycles peuvent être extrêmement courts.

Auxiliaires : de nombreux auxiliaires sont présents sur les sites, toujours syrphes et coccinelles, mais également des cécidomyies et hyménoptères en nombre. Les chrysopes commencent à arriver, les signalements varient selon les sites. Des populations tout de même en difficultés à cause de la chaleur.

Maladies : maintien de l'oïdium, maladies sur rosiers.

Vigilance datura : un risque sanitaire, économique et environnemental à ne pas sous-estimer !

Le datura est une adventice particulièrement redoutée en raison de sa **très forte toxicité**. Toutes les parties de la plante, notamment les graines, contiennent des alcaloïdes pouvant entraîner des intoxications graves voire mortelles chez l'homme et les animaux. Sa présence en parcelle constitue un **risque majeur de contamination des récoltes**, pouvant conduire à des refus en filière ou à des pertes économiques importantes mais aussi avoir un impact environnemental. Quelques fragments suffisent à contaminer un lot et à dépasser les seuils réglementaires.

Face à cet enjeu, la **détection précoce et l'intervention rapide** sont essentielles pour limiter sa dissémination et protéger la qualité des productions, la santé humaine et





l'environnement. Malheureusement, nous n'avons que peu de données sur sa présence et sa répartition francilienne. A toutes fins utiles, en appuyant sur la photo de datura (ci-dessus), vous serez redirigé vers une fiche d'identification du datura.

👉 En Île-de-France, **vous pouvez contribuer à la surveillance collective** grâce à la plateforme, notamment par le signalement de la localisation du datura sur Signal Espèces : <https://www.signal-especes.fr>

AUXILIAIRES

	20-mars	3-avr.	17-avr.	1-mai	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	Commentaires	Evolution
Cécidomyies		L														en serre de vente	↑
Syrphes		L	LA	AL	OLA	OLA		OLA	OLA							<i>Chrysanthemum</i> , ING	=
Chrysopes							LA	L	OL							vivaces, plantes fleuries (œufs)	=
Coccinelles		AL	LA	AL	OLNA	OLNA	OLA	OLNA								<i>Chrysanthemum</i>	↓
Momies de pucerons de micro-Hyménoptères et praons						AL											↓
Punaies: Orius, Macrolophus, Myrdes, Anthocoride			A				A	A									=

RAVAGEURS

		21-mars	4-avr.	18-avr.	2-mai	16-mai	30-mai	13-juin	27-juin	11-juil.	25-juil.	8-août	22-août	5-sept.	19-sept.	3-oct.	Commentaires	Evolution
Ordre Acariformes	Acarie - dont tarsonèmes																	
	Serres																<i>Citrus</i> , <i>Crocsmia</i> , <i>Dieffenbachia</i> , <i>Hydrangea</i> , ING, <i>Ipomea</i> , <i>Lantana</i> , <i>rosiers</i> , <i>Salvia</i>	↑
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																<i>Lantana</i> , <i>Salvia</i>	
Ordre-Lepidoptères	Chenilles phytophages (noctuelles, pyrales, tordeuses...)																	
	Serres																<i>Anthurium</i> , <i>Ensete</i> , <i>Ipomea</i> , <i>Musa</i> , <i>Géranium zonal</i> , <i>Lantana tiges</i> , <i>Phylodendron</i> , <i>Plumbago tiges</i> , <i>Spathiphyllum</i>	=
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																	
	Duponchelia fovealis																	
	Serres																	
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																	
	Chrysodeixis chalcites																	
	Serres																<i>Calanthe</i> , <i>Lycaste</i> , <i>Caryota</i>	↓
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																	
	Brun du Pelargonium (Cacyreus Marshalli)																	
	Serres																	=

- Formation de miellat (risque de développement de fumagine),
- Transmission de pathogène (maladie/virus)

Prophylaxie/ Lutte biologique :

- Eliminer les anciennes séries,
- Réaliser un vide sanitaire avec désinfection quand cela est possible,
- Observer les jeunes plants ou plantes à la réception,
- Observer en cours de culture les plantes sensibles, les organes jeunes ...
- Utiliser les pièges englués rouges ou jaunes (1 panneau / 200 à 500m²) placés au-dessus ou au niveau de la culture.



Cochenilles

Ce ravageur concerne essentiellement des plantes de collections ou des plantes vertes séjournant sur une longue période dans l'abri. Les populations restent localisées mais peuvent contaminer les cultures alentour, et sont difficiles à déloger une fois bien installées.

Prophylaxie/ Lutte biologique :

Il est très difficile d'enrayer un foyer de cochenilles, il est donc fortement conseillé de bien observer les cultures pour pouvoir intervenir tôt en éliminant les plantes atteintes.

L'usage d'huile peut être efficace uniquement si l'application se fait sur les larves en phase mobile, ce qui représente un laps de temps très court.

Pucerons

Symptômes – dégâts :

- Déformations du feuillage et des fleurs, avortements de fleurs, ralentissement de la croissance dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir,
- Exuvie (mue des larves),
- Développement de fumagine,
- Symptômes liés à la présence de virus (les pucerons sont susceptibles de transmettre les virus de type CMV, PVY...).



Prophylaxie/ Lutte biologique :

- Surveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en suspension et refuser tout lot suspect,
- Limiter les apports d'engrais favorisant des pousses très tendres,
- Détecter et contrôler les niveaux de populations (piégeage de pucerons ailés sur panneaux englués),
- Favoriser les auxiliaires.



		21-mars	4-avr.	18-avr.	2-mai	16-mai	30-mai	13-juin	27-juin	11-juil.	25-juil.	8-août	22-août	5-sept.	19-sept.	3-oct.		
Ordre Thysanoptères Famille Thripidés	Thrips clairs dont <i>T.tabaci</i>, <i>F.occidentalis</i>																	
	Serres																	Ageratum, Araucaria, Anthurium, Asplenium, Alocasia, Citrus, croton, Cténanthe, Dieffenbachia, Dahlia, Epiprenium, Ficus, Hydrangea, Lantana tiges, Marantha, Plectranthus, Poinsettia, Philodendron, Plumbago tiges, Schefflera, Verbena
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																	Chrysanthemum
	Thrips setosus																	
	Serres																	
	DPG																	
	Tunnels																	
	Ext																	
	Echinothrips americanus																	
	Serres																	Acalypha, Croton, Dahlia, ING
	DPG																	
	Tunnels																	

- Utiliser les pièges englués jaunes (1 panneau / 200 à 500m²) et réaliser une détection précoce des foyers,
- Apport d'auxiliaires prédateurs possible.

	20-mars	3-avr.	17-avr.	1-mai	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	Commentaires	Evolution
Botrytis																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																Chrysanthemum, rosiers	
Oïdium																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																	
Maladies des taches noires																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																rosiers	
Mildiou																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																	
Rouille																	↓
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																	
Rouille blanche (ORNQ)																	
Ext																Chrysanthemum	
Septoriose																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																	
Pythium - Phytophthora																	=
Serres																Lewisia	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																Chrysanthemum	
Fusariose																	=
Serres																	
DPG																	
Tunnels																	
Ext																Chrysanthemum	

Botrytis

Symptômes – dégâts :

Cette pourriture molle et grise se développe dans le cœur des plantes et sur les feuilles de la base. C'est un parasite de faiblesse qui colonise le végétal par exemple à la faveur d'une blessure pouvant être mécanique, ou d'une lésion créée par une autre maladie.

Prophylaxie/ Lutte biologique :

- Eliminer les parties de culture atteintes sur la plante et au sol,
- Eviter les arrosages par le dessus,
- Ajuster l'irrigation au besoin de la culture,
- Si possible, arroser et traiter le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le ressuyage et avoir un feuillage sec pendant la nuit,
- Distancer les cultures,
- Aérer les abris dès que le temps le permet afin d'éviter l'humidité stagnante ou les fortes hygrométries (arrosage par aspersion) couplées avec des températures entre 18 et 23°C,
- Les fructifications par très forte humidité permettent les contaminations secondaires,



- Eviter les fertilisations trop azotées.

Oïdium

Symptômes – dégâts :

Développement d'un feutrage blanc d'aspect farineux à la surface des feuilles.

Prophylaxie/ Lutte biologique :

- Eliminer les débris végétaux des parcelles et de leur environnement,
- Détruire dans la parcelle et ses abords les adventices pouvant servir de plantes relais au champignon parasite,
- Effectuer un vide sanitaire.



Mildiou

Symptômes – dégâts :

- Sur la face supérieure des feuilles : décolorations ponctuelles claires puis brunes, et nécroses pouvant se généraliser à l'ensemble de la feuille qui s'enroule,
- Sur la face inférieure des feuilles : feutrage brun ayant l'aspect d'un duvet,
- Les feuilles atteintes se dessèchent rapidement. La plante a un aspect rabougri, voire meurt.

Prophylaxie/ Lutte biologique :

- Inspecter le jeune plant lors de son arrivée,
- En cours de culture, surveiller régulièrement les plantes (sous les feuilles),
- Si vous détectez des plantes contaminées, il est impératif d'éliminer les plantes trop atteintes.

FICHES ORGANISMES REGLEMENTES FILIERE JEVI / ARBRES / PLANTES ORNEMENTALES

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRAE : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-jevi-arbres-plantes-ornementales-r738.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

METHODES ALTERNATIVES

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante :

<https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>



La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAf est disponible [ici](#).

Le site de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) consacré aux substances de base a été rénové, avec une entrée soit par substance, soit par usage.

<https://itab.bio/substances>

- **Observations :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiolo-surveillance d'Ile de France.
- **Rédaction :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France : Elisabeth LECLERCQ pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture :** DRIAf – SRAL, FREDON Ile de France