



N°15
25/09/2023

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Île de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles		Présences généralisées

EXT : extérieur, TU : tunnel, DPG : double paroi gonflable, SE : serres
Photos CARIDF-Cercle des Horticulteurs IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE

	ven. 22	sam. 23	dim. 24	lun. 25	mar. 26	mer. 27	jeu. 28
	2.5	0	0	0	0	0	0.4
	56 / 88	49 / 95	46 / 92	50 / 90	55 / 87	53 / 96	56 / 91
	11 / 16	9 / 17	8 / 20	8 / 23	13 / 24	13 / 24	15 / 22

Station de LIEUSAIN (77)

Climatologie : Cette quinzaine a été marquée par de fortes chaleurs entre-coupées d'épisodes pluvieux.

Auxiliaires : Le nombre d'auxiliaires se maintient. On observe principalement des chrysopes, des coccinelles et des syrphes au stade adulte.

Ravageurs : Les foyers de thrips continuent de se multiplier sur les cultures d'automne. On retrouve les plus importants foyers sur les cultures de chrysanthèmes, de poinsettias et de cyclamens.

Maladies : Pression en hausse importante des maladies foliaires et racinaires.

AUXILIAIRES

	7-mars	22-mars	6-avr.	21-avr.	6-mai	21-mai	5-juin	20-juin	5-jul.	20-juil.	28-juil.	11-août	25-août	8-sept.	22-sept.	6-oct.	20-oct.		Evolu- tion		
Cécidomyies																				↑	
Syrphes																				Cyclamen,	=
Chrysopes																				Chrysanthème, pensée	↑
Coccinelles																				Chrysanthème	=
Momies de pucerons de micro-Hyménoptères																					↓
Momies de pucerons de praon																					=
Punaies: Orius, Macrolophus, Myrrides, Anthocoride																				Chrysanthème	↑

		7-mars	22-mars	6-avr.	21-avr.	6-mai	21-mai	5-juin	20-juin	5-juil.	20-juil.	4-août	19-août	3-sept.	18-sept.	3-oct.	18-oct.	2-nov.			
Ordre Acariformes	ACARIENS- dont tarsonèmes																				
	Serres																			<i>Datura, Phalenopsis, Alocasia</i>	
	DPG																			<i>Chrysanthème</i>	
	Tunnels																			<i>Chrysanthème</i>	
	Extérieur																			<i>Dahlia,</i>	
Ordre Hemiptères, sous ordre Homoptères Famille Aleyrodidés	ALEURODES- dont trialeurodes, bemisia ...																				
	Serres																				
	DPG																				
	Tunnels																				
	Extérieur																			<i>Dsauge granny</i>	
Ordre-Lepidoptères	CHENILLES PHYTOPHAGES- vraies chenilles-noctuelles, pyrales, tordeuses																				
	Serres																			<i>Hemigraphis, Plectranthus, Erysiumv, Choux</i>	
	DPG																			<i>Choux d'ornement , Cardon ,</i>	
	Tunnels																			<i>Choux d'ornement , Cardon ,</i>	
	Extérieur																				
	Duponchelia																				
	Serres																			<i>Poinsettia, Cyclamen</i>	
	DPG																				
	Tunnels																				
	Extérieur																				
	Mineuses azalées																				
	Serres																				
	DPG																				
Tunnels																					
Extérieur																					
Ordre Hemiptères-super famille coccoides	COCHENILLES FARINEUSES																				
	Serres																			<i>Alocasia, Plectranthus, Corossol, Croton, Dracaena, Schefflera,, Croton</i>	
	DPG																				
	Tunnels																				
	Extérieur																				
	COCHENILLES LECANINES																				
	Serres																			<i>Citrus , Solestrenom, Lantana,</i>	
	DPG																				
	Tunnels																				
	Extérieur																				
	COCHENILLES DIASPINES																				
	Serres																				<i>Corossol, Croton, Dracaena, Fougères, Cordyline, Angraecum</i>
	DPG																				
Tunnels																					
Extérieur																					

		7-mars	22-mars	6-avr.	21-avr.	6-mai	21-mai	5-juin	20-juin	5-juil.	20-juil.	4-août	19-août	3-sept.	18-sept.	3-oct.	18-oct.	2-nov.			
Ordre Hemiptères, sous ordre Homoptères, Famille Cicadellidés	CICADELLES																				
	Serres	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange		
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Chrysanthème,
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Chrysanthème, Dahlia,
Ordre Thysanoptères Famille Thripidés	THRIPS dont <i>t.tabaci</i>, <i>Frankliniella</i>																				
	Serres	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange		Chrysanthème, Cyclamen, Croton, Eysium, Alocasia, Poinsettia
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Chrysanthème, Cyclamen
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Chrysanthème
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Chrysanthème
	THRIPS setosus																				
	Serres	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Echinothrips americanus																				
	Serres	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange		Anthurium
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert			
Classe Gastéropodes	ESCARGOTS et LIMACES																				
	Serres	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Menthe
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
Ordre Diptères	MINEUSES																				
	Serres	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		Cinénaire maritime,
Ordre Diptères	MOUCHES DES TERREUX																				
	Serres	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange		Echeveria
	DPG	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Tunnels	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		
	Extérieur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert		

		7-mars	22-mars	6-avr.	21-avr.	6-mai	21-mai	5-juin	20-juin	5-juil.	20-juil.	4-août	19-août	3-sept.	18-sept.	3-oct.	18-oct.	2-nov.		
Ordre Hemiptères sous ordre Homoptères Famille Aphididés	PUCERONS																			
	Serres																			
	DPG																			
	Tunnels																			<i>Chrysanthème,</i>
	Extérieur																			<i>Chrysanthème, Rosier</i>
	<i>Pucerons-Aulacorthum solani</i>																			
	Serres																			
	DPG																			
	Tunnels																			
	Extérieur																			
	<i>Pucerons-Macrosiphum euphorbiae</i>																			
	Serres																			
	DPG																			
	Tunnels																			
	Extérieur																			
	<i>Pucerons-Myzus persicae</i>																			
	Serres																			
	DPG																			<i>Cyclamen,</i>
	Tunnels																			
	Extérieur																			
	<i>Pucerons-Aphis gossypii</i>																			
	Serres																			<i>Schefflera</i>
	DPG																			
	Tunnels																			
	Extérieur																			
	<i>Pucerons-Aphis fabae</i>																			
	Serres																			
	DPG																			<i>Cardon</i>
Tunnels																				
Extérieur																				


Acariens

Présence de foyers d'infestations qui se régulent par élimination des plantes touchées.

SYMPTOMES – DEGATS :

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE

- Surveiller les points chauds de la serre (à proximité des tuyaux de chauffage, des plots en ciment),
- Observer les plantes les plus attractives de la serre (Lantanas, Impatiens NG),
- Maintenir une hygrométrie élevée (mouiller les allées de la serre) et limiter les températures fortes,
- Apport d'auxiliaires (*Neoseiulus californicus* : résiste aux fortes chaleurs / *Feltiella acarisuga* et *Phytoseiulus persimilis* : difficulté de développement au-delà de 34°C).



Cercle des horticulteurs IDF - CAR-IDF

Aleurodes

SYMPTOMES – DEGATS :

- Présence en face inférieure des feuilles,
- Piqûres de nutrition qui provoquent des mouchetures et entraînent une réduction de croissance, les déjections de miellat tachent le feuillage et favorisent le développement de fumagine (ensemble de champignons, qui dévalorise les potées fleuries),
- *Bemisia tabaci* est vecteur de virus dont le TYLC auquel le Poinsettia est très sensible.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Vérifier la qualité sanitaire des boutures et jeunes plants,
- Bien nettoyer tous les déchets de culture,
- Piégeage avec des panneaux englués jaunes,
- Pas de cohabitation avec une culture porteuse du ravageur,
- Apport d'auxiliaires (*Nesidiocoris tenuis* / *Delphastus catalinae* : résistance jusqu'à 35°C / *Amblyseius swirskii*).



Cercle des horticulteurs IDF - CAR-IDF

Chenilles

SYMPTOMES – DEGATS : Les attaques de chenilles, engendrées par la mastication des organes de la plante, peuvent causer des dépréciations importantes de la qualité esthétique du végétal.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Vérifier la qualité sanitaire des boutures et jeunes plants,
- Bien nettoyer tous les déchets de culture,
- Piégeage des papillons avec des panneaux englués,
- Pas de cohabitation avec une culture porteuse du ravageur,
- Favoriser les oiseaux insectivores,
- Lâcher d'auxiliaires sur des chenilles spécifiques.

Cochenilles

Ce ravageur concerne essentiellement des plantes de collections ou des plantes vertes séjournant sur une longue période dans l'abri. Les populations restent localisées mais peuvent contaminer les cultures alentour.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE

Il est très difficile d'enrayer un foyer de cochenilles, il est donc fortement conseillé de bien observer les cultures pour pouvoir intervenir tôt en éliminant les plantes atteintes.

L'usage d'huile peut être efficace uniquement si l'application se fait sur les larves en phase mobile, ce qui représente un laps de temps très court.

Cicadelles

Baisse significative de la pression sur la dernière quinzaine, bonne régulation sur les plantes en extérieur.

Cet hémiptère piqueur-suceur très mobile est un vecteur de pathogène important. La cicadelle est très polyphage.

SYMPTOMES – DEGATS :

- Dégâts directs :
 - Décoloration foliaire ou stigmonose
 - Déformation
 - Ralentissement de la croissance
- Dégâts indirects
 - Formation de miellat (risque de développement de fumagine,
 - Transmission de pathogène (maladie/virus)



Cercle des horticulteurs IDF - CAR-IDF

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE

- Eliminer les anciennes séries,
- Réaliser un vide sanitaire avec désinfection quand cela est possible,
- Observer les jeunes plants ou plantes à la réception,
- Observer en cours de culture les plantes sensibles, les organes jeunes ...
- Utiliser les pièges englués rouges ou jaunes (1 panneau / 200 à 500m²) placés au-dessus ou au niveau de la culture.



Pucerons

Faible hausse de la pression, bien observer les premiers foyers pour limiter les dégâts sur cultures.

SYMPTOMES – DEGATS :

- Déformations du feuillage et des fleurs, avortements de fleurs, ralentissement de la croissance dû aux piqûres des pucerons pour se nourrir,
- Exuvie (mue des larves),
- Développement de fumagine,



- Symptômes liés à la présence de virus (Les pucerons sont susceptibles de transmettre les virus de type CMV, PVY...).

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Surveiller les plantes, cultures sensibles, les arrivages de plantes, les plantes en suspension et refuser tout lot suspect.
- Limiter les apports d'engrais favorisant des pousses très tendres.
- Détecter et contrôler les niveaux de populations (piégeage pucerons ailés sur panneaux englués).
- Favoriser les auxiliaires.

Thrips

Fortement présents, il est important d'éliminer les foyers, au plus vite, pour cela une observation assidue des cultures sensibles est nécessaire.

Différentes espèces sont des ravageurs des cultures horticoles :

-*Frankliniella occidentalis* : le thrips californien très polyphage,

-*Thrips tabaci* est le thrips du tabac et de l'oignon,


-*Thrips setosus* : l'adulte est noir et la larve translucide. C'est un thrips du feuillage,

-*Echinothrips americanus* est rare mais il peut être rencontré. L'adulte est noir alors que la larve est blanchâtre.

SYMPTOMES – DEGATS :

- Sur feuilles : plages de cellules vidées de leur contenu avec une apparence argentée, déformations de jeunes pousses, œdèmes sur les faces inférieures des feuilles.
- Sur fleurs : coulures de pollen, déformations des boutons.

Frankliniella occidentalis est vecteur de virus comme TSWV, INSV dont les symptômes sont des taches nécrotiques, annulaires, chlorotiques, des mosaïques...



Cercle des horticulteurs IDF -
CAR-IDF

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Eliminer les anciennes séries,
- Réaliser un vide sanitaire avec désinfection quand cela est possible,
- Effleurer si la période de vente le permet,
- Observer les jeunes plants ou plantes à la réception,
- Observer en cours de culture les plantes sensibles, les organes jeunes, frapper les fleurs...
- Utiliser les pièges englués bleus (1 panneau / 200 à 500m²) et les produits olfactifs pour renforcer le piégeage et réaliser une détection des foyers précocement (1 diffuseur / 100m² à renouveler toutes les 4 à 6 semaines),
- Apport d'acariens prédateurs.

Mouche des terreaux

SYMPTOMES – DEGATS :

- C'est l'asticot de cette petite mouche qui crée des dégâts principalement sur le jeune plant en attaquant les racines et le collet. Selon le stade de la culture, l'impact peut être important.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Eliminer les anciennes séries,
- Réaliser un vide sanitaire avec désinfection quand cela est possible,
- Observer les jeunes plants ou plantes à la réception,
- Observer en cours de culture les plantes sensibles, les organes jeunes, frapper les fleurs...
- Utiliser les pièges englués jaunes (1 panneau / 200 à 500m²) et réaliser une détection précoce des foyers,
- Apport d'auxiliaires prédateurs possible.

		7-mars	22-mars	6-avr.	21-avr.	6-mai	21-mai	5-juin	20-juin	5-juil.	20-juil.	28-juil.	11-août	25-août	8-sept.	22-sept.	6-oct.	20-oct.			
	BOTRYTIS																				
	Serres	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Orange	Grey	Grey		<i>Cyclamen,</i>	
	DPG	Green	Green	Green	Orange	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Grey		
	Tunnels	Green	Green	Orange	Green	Green	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Grey	Grey		<i>Primula acaulis, Cyclamen</i>
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Grey	Grey			<i>Lisianthus</i>
	OIDIUM																				
	Serres	Orange	Orange	Orange	Yellow	Red	Orange	Orange	Orange	Red	Orange	Orange	Green	Green	Yellow	Green	Grey	Grey			
	DPG	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Grey	Grey			<i>Pensée, Aster</i>
	Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Grey	Grey			
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Red	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Grey	Grey				<i>Torunesol, Rosier, Lagerstroemia, Rosier, Hortensia, Chrysanthème</i>
	Maladies des taches noires																				
	Serres	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Orange	Red	Orange	Green	Green	Yellow	Green	Green	Grey	Grey			
	DPG	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Grey	Grey	
	Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Orange	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Grey	Grey			<i>Rosier,</i>
	MILDIU																				
	Serres	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Red	Grey	Grey			<i>Basilic, Menthe, Thym, Verveine</i>
	DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	ROUILLE																				
	Serres	Green	Green	Orange	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	ROUILLE BLANCHE																				
	Tunnel	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Grey	Grey			<i>Chrysanthème</i>
	PYTHIUM-PHYTOPHTORA																				
	Serres	Green	Green	Green	Orange	Orange	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey			<i>Scindapsus aureus,</i>
	DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Grey	Grey			<i>Chrysanthème</i>
	VERTICULOSE																				
	Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Grey	Grey			<i>Dahlia,</i>

Les conditions météorologiques chaudes et humides (notamment la nuit) augmentent significativement le risque de maladies fongiques. Pour réduire les risques un distancage assidu, une bonne aération et un arrosage fractionné sont recommandées. Surveillez, par ailleurs, les adventices sous les tablettes qui peuvent être à l'origine des premiers foyers. Enfin isolez ou éliminez les plantes que vous soupçonnez d'être malades.

Botrytis

En forte hausse au cours de la dernière quinzaine.

SYMPTOMES – DEGATS :

Cette pourriture molle et grise se développe dans le cœur des plantes et sur les feuilles de la base. C'est un parasite de faiblesse qui colonise le végétal par exemple à la faveur d'une blessure pouvant être mécanique, ou d'une lésion créée par une autre maladie.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Eliminer les parties de culture atteintes, sur la plante et au sol.
- Eviter les arrosages par le dessus.
- Ajuster l'irrigation au besoin de la culture.
- Si possible, arroser et traiter le matin par journée bien ensoleillée afin de permettre le ressuyage et avoir un feuillage sec pendant la nuit.
- Distancer les cultures.
- Aérer les abris dès que le temps le permet afin d'éviter l'humidité stagnante ou les fortes hygrométries (arrosage par aspersion) couplées avec des températures entre 18 et 23°C.
- Les fructifications par très forte humidité permettent les contaminations secondaires.
- Eviter les fertilisations trop azotées.

Cercle des horticulteurs IDF
- CAR-IDF



Oïdium

Conservé sur les cultures de printemps, et sur les adventices isoler les plantes infestées.

SYMPTOMES – DEGATS :

Développement d'un feutrage blanc d'aspect farineux à la surface des feuilles.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Eliminer les débris végétaux des parcelles et de leur environnement.
- Détruire dans la parcelle et ses abords les adventices pouvant servir de plantes relais au champignon parasite.
- Effectuer un vide sanitaire.

Cercle des horticulteurs
IDF - CAR-IDF



Mildiou

La maladie peut progresser rapidement et engendrer la mort de la plante. Très contagieuse, éliminer les plantes infestées au plus vite.

SYMPTOMES – DEGATS :

- Sur la face supérieure des feuilles : décolorations ponctuelles claires puis brunes, et nécroses pouvant se généraliser à l'ensemble de la feuille qui s'enroule,
- Sur la face inférieure des feuilles : feutrage brun ayant l'aspect d'un duvet,
- Les feuilles atteintes se dessèchent rapidement. La plante a un aspect rabougri, voire meurt.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Inspecter le jeune plant lors de son arrivée,
- En cours de culture, surveiller régulièrement les plantes (sous les feuilles),
- Si vous détectez des plantes contaminées, il est impératif d'éliminer les plantes trop atteintes.

Rouille

SYMPTOMES – DEGATS : Les symptômes sont visibles principalement sur le limbe. Aux taches vertes jaunâtres de la face supérieure correspondent des pustules à la face inférieure du limbe. Celles-ci se déchirent et libèrent une masse pulvérulente brune.

PROPHYLAXIE/ LUTTE BIOLOGIQUE :

- Obtenir une bonne aération des cultures par l'aération des serres et par distançage,
- Eviter de mouiller le feuillage,
- Eliminer les feuilles et plantes trop atteintes.



BIOCONTROLE

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante :

<https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAAF est disponible [ici](#).

Enfin, les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse :

<http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>

-
- **Observations** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiolo-surveillance d'Ile de France.
 - **Rédaction** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France :
 - Alexis BONNEAUD pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
 - **Comité de relecture** : DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France