



N° 18

06/08/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Chambre d'Agriculture de France



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Pommes de terre : aucun risque mildiou n'est prévu pour les prochains jours. Des doryphores et des cicadelles sont toujours observés ainsi que des symptômes d'alternariose.

Oignon : le risque mildiou à venir est faible voire nul. La pression en thrips reste élevée. Des galeries de mouches mineuses ainsi que des symptômes de botrytis squamosa sont toujours observés.

Fraise : la présence de pucerons, de thrips, d'acariens, de punaises et de noctuelles est relevée. Des *drosophile suzukii* mâles ont été piégés.

Laitue : des noctuelles défoliatrices, des mouches mineuses et des thrips sont toujours présents. Des symptômes de mildiou, sclérotinia et botrytis sont observés.

Tomate : des pucerons, acariens, noctuelles (défoliatrices, gamma, des fruits), punaises, mouches mineuses et aleurodes sont toujours observés. Des individus de mouches *tuta absoluta* ont été capturés. La pression en maladie augmente : mildiou, botrytis, cladosporiose et oïdium.

Chou : la pression des altises diminue. Des aleurodes sont toujours observés.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94) :

	jeu. 6	ven. 7	sam. 8	dim. 9	lun. 10	mar. 11	mer. 12
	0	0	0	0	1.7	0.4	0
	25 / 65	25 / 73	18 / 71	25 / 54	26 / 57	35 / 76	29 / 89
	16 / 26	14 / 26	13 / 31	16 / 33	18 / 32	18 / 31	19 / 33

STADES

Début sénescence à 50 % sénescence.

MALADIES

• Mildiou - *Phytophthora infestans*



Aucun risque n'a été enregistré la semaine dernière sur les différents postes météorologiques de la région, d'après le modèle Mileos®.

Malgré les conditions météorologiques actuelles favorables au développement du mildiou pour les postes de Nangis (77) et de Chailly-en-Brie (77), les réserves de spores étant faibles au 4 août (et pour les trois jours à venir) pour l'ensemble des postes, aucun risque n'est prévu. Pour le reste des stations météorologiques, le risque est aussi nul.

Dans la majorité des sites suivis, des symptômes de mildiou non sporulants sont toujours observés.

Situation au 4 août :

Stations météorologiques	Jours où le seuil indicatif de risque a été atteint			Réserves de spores au 04/08 à 8h00	Seuil indicatif de risque atteint			Pluies depuis le 28/07
	Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante		Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
77-Chailly-en-Brie				faible	non	non	non	9,2
77-Faÿ-Lès-Nemours				faible	non	non	non	0
77-Nangis				faible	non	non	non	0
78-Boissy-sans-Avoir				faible	non	non	non	0,8
78-Ménerville				faible	non	non	non	2
91-Etampes				faible	non	non	non	3,3
95-Vémar				faible	non	non	non	1,7
95-Villiers-en-Arthies				faible	non	non	non	0

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n'est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d'orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, il ne prend pas en compte l'irrigation, il n'est valable que pour des parcelles non irriguées.

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement. La protection doit se maintenir même après le défanage.

Pour connaître la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre, vous pouvez consulter le site du [Plant français de la pomme de terre dans la rubrique variétés](#).

A RETENIR

Risque : aucun risque de contamination n'est prévu, quelle que soit la sensibilité variétale.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Le seuil indicatif de risque :

Pour que le seuil soit atteint, il faut d'une part, que le potentiel de sporulation soit atteint :

Moyen pour les variétés sensibles,

Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires,

Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes,

et d'autre part que les conditions météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21 °C durant 6 heures consécutives ou supérieures à 15 °C pendant 8 heures.

Si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez la fiche "[modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre](#)". Elle décrit entre autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mildiou / pomme de terre / OPUC (fluazinam) est exposé à un risque de résistance.
Le groupe mildiou / pomme de terre / RNAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) est exposé à un risque de résistance.

• *Alternaria, Alternaria solani*



Quelques feuilles présentent toujours des symptômes d'alternariose à La Houssaye-en-Brie (77).

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°17 du 3 juin 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

RAVAGEURS

• Pucerons



Comme lors des relevés précédents, aucun puceron n'est observé cette semaine, dans l'ensemble des sites suivis.

Des coccinelles et araignées auxiliaires sont observées à La Houssaye-en-Brie (77) et Saint-Souplets (77).

Pour avoir des informations sur les pucerons et les virus, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste faible.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50 % des folioles notées.

• Doryphores



Les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et de Villeron (95) présentent des individus adultes. La semaine dernière, seule la parcelle à Villeron (95) était touchée (cf. tableau ci-dessous).

	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
77-SAINT-SOUPPLETS	Absence	Absence	Absence
77-POINCY	Quelques adultes	Absence	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	Absence	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
91-ANGERVILLE	Absence	Absence	Absence
95-VILLERON	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	1 foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total).

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• Cicadelles



Des cicadelles sont toujours observées sur les sites de Saint-Soupplets (77), La Houssaye-en-Brie (77) et Villeron (95). Des piqûres sont aussi observées sur ces mêmes sites (cf. tableau ci-dessous).



Piqûres de cicadelles (FREDON Ile de France)

	Semaine 31	Semaine 32
77-SAINT-SOUPPLETS	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres
77-POINCY	Présence d'adultes et de piqûres	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres
91-ANGERVILLE	Absence	Absence
95-VILLERON	Présence d'adultes et de piqûres	Présence d'adultes et de piqûres

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°17 du 3 juin 2026](#).

STADES

Pour les oignons semis, bulbe ayant atteint 70 % de sa taille finale.

MALADIES

- **Mildiou, *Peronospora destructor***



Pour l'ensemble des postes météorologiques, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée depuis la semaine dernière, d'après le modèle Miloni de la DGAL.

	Données du modèle au 04/08/2026			Date prévue de sortie de taches	Risque mildiou	
	Dates des dernières contaminations	Génération	% d'incubation		Oignons bulbilles	Oignons semis
78-Boissy-sans-Avoir	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
78-Les Mureaux	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Villenoy	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Lumigny	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
91-Torhou	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
95-Vémars	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions météorologiques).

Attention, le modèle ne prend pas en compte l'irrigation des parcelles, le risque peut être dans ce cas-là plus important.

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul pour l'ensemble des secteurs.

Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.

Seuil indicatif de risque :

pour les oignons bulbilles, dès la 2^{ème} génération.

pour les semis, dès la 3^{ème} génération.

Pour avoir des informations sur le cycle du mildiou de l'oignon, consultez le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#) et la fiche "[Modèle MILONI : Mildiou de l'oignon](#)". Cette dernière informe également des mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement du mildiou.

- **Botrytis Squamosa**



Cette semaine, 5 % des plantes présentent des symptômes de botrytis à Torhou (91) et La Houssaye-en-Brie (77). Aucun symptôme n'avait été observé lors des relevés précédents.

A RETENIR

Risque : le risque augmente et devient faible à modéré.



Pour obtenir davantage d'informations sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°13 du 30 juin 2026](#).

RAVAGEURS

• Thrips, *Thrips tabaci*



La pression des thrips reste élevée cette semaine avec l'ensemble des sites suivis présentant des infestations de thrips (cf. tableau ci-dessous). Le seuil de risque est toujours dépassé à La Houssaye-en-Brie (77).

Des thrips auxiliaires (*Aeolothrips intermedius*) sont également observés sur ces différentes parcelles.

	Semaine 31			Semaine 32		
	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence
77-POINCY	45 %	0,7	35 %	45 %	0,8	25 %
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	75 %	7,2	35 %	70 %	3,8	40 %
91-TORFOU	20 %	0,2	10 %	10 %	0,1	10 %
91-ANGERVILLE	10 %	0,2	0 %	10 %	0,4	5 %

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste modéré à important. Les conditions météorologiques continueront d'être propices à leur développement dans les prochains jours.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

• Mouches mineuses, *Lyriomyza cepae*



Des galeries de mouches mineuses (*Lyriomyza cepae*) sont observées cette semaine à Torfou (91) et Poincy (77), sur 5 % des plantes.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°18 du 10 juin 2026](#).



Mines sur oignon
(FREDON Ile de France)

STADES

Fraises hors-sols sous abri : fruits blancs à récolte.

RAVAGEURS

• PUCERONS

La pression des pucerons augmente légèrement cette semaine, avec deux sites touchés (cf. tableau ci-dessous). Des araignées auxiliaires et des chrysopes ont aussi été observés à La Houssaye-en-Brie (77) et Villerooy (77).



Colonie de pucerons sur fraisier (FREDON Ile de France)

	Pieds touchés		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	0 %	0 %	0,1 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	15 %	5 %
77 - VILLEROY	0 %	0 %	0 %

Pour avoir plus d'informations sur les pucerons des fraisiers, consultez la fiche « [Ravageur : les pucerons en culture de fraisier sous abris](#) » du CTIFL. Vous pouvez aussi consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré. Les conditions météorologiques futures seront favorables à leur développement.

Seuil indicatif de risque : 5 individus pour 10 feuilles.



Des produits de biocontrôle existent.

• THRIPS



Des thrips ont été observés ces deux dernières semaines sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Villerooy (77) (cf. tableau ci-dessous). La pression augmente pour ce ravageur car aucun individu n'avait été relevé lors des relevés précédents dans l'ensemble des sites suivis. Des aleoethrips sont aussi relevés à Villerooy (77).

	Semaine 31		Semaine 32	
	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	0,05	5 %	0,05
94 - PERIGNY	0 %	0	0 %	0
77 - VILLEROY	0 %	0	25 %	0,25

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consultez le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque augmente et devient faible à modéré. Les conditions météorologiques futures pourraient être propices à leur développement.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par fleur.

• ACARIENS



Seul le site de Périgny (94) présente des formes mobiles cette semaine (cf. tableau ci-dessous). La pression pour ce ravageur reste identique.

	Pieds touchés		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	0 %	1 %	2 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	0 %	0 %
77 - VILLEROY	0 %	0 %	0 %



Toile liée à la présence d'acarien sur fraisier (FREDON Ile de France)

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 5 formes mobiles par feuille.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe acarien / fruits rouges / ACHEI (organophosphorés) est exposé à un risque de résistance.

• PUNAISES, *Lygus sp.*



Des fruits déformés par des punaises ont été observés sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Villeroy (77) ces deux dernières semaines (cf. tableau ci-dessous).

	Pieds touchés par des déformations de fruits		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	30 %	20 %	10 %
77 - VILLEROY	0 %	5 %	20 %



Pour avoir de plus amples informations, consulter [« LES PUNAISES EN CULTURE DE FRAISES : ELEMENTS DE RECONNAISSANCE »](#) de FREDON Haut-de-France.

A RETENIR

Surveillez l'évolution des populations et l'émergence de jeunes larves dans vos cultures afin de détecter les premiers individus, ou à défaut les premiers dégâts.

• DROSOPHILES, *Drosophila suzukii*



Des drosophiles mâles ont été capturées à La Houssaye-en-Brie (77).
Aucun dégât n'a été observé sur les fruits sur l'ensemble des sites suivis.

	Mâles capturés		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0	1	6
77 - PERIGNY	0	0	0



Dégâts de drosophiles sur fraise avec une larve.

Pour avoir plus d'information sur la drosophile suzukii, consultez la fiche [drosophile suzukii](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Eviter les points d'eau stagnante, en maîtrisant l'irrigation.
Aérer les cultures en taillant le feuillage.
Eliminer l'ensemble des fruits non récoltés et de les évacuer en dehors du site de production.
Récolter tous les deux jours pour limiter les dégâts.



Des produits de biocontrôle existent.

• NOCTUELLES DEFOLIATRICES



Des dégâts ou des chenilles ont été observés sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Villeroy (77).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#) ou encore [ephytia/inrae](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

LAITUE

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

4 Feuilles étalées à 12 à 18 feuilles.

RAVAGEURS

• PUCERONS, *Nasonovia ribisnigri*



Comme lors des relevés précédents, aucun puceron n'est observé dans l'ensemble des sites du réseau. Des syrphes et araignées auxiliaires sont relevés dans la majorité des parcelles suivies.

A RETENIR

Risque : faible. Les conditions météorologiques à venir pourraient permettre leur développement.

Seuil indicatif de risque : 10 % des pieds avec au moins 1 aptère.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 04 du 30 avril](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n°04 du 30 avril](#).



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe *Nasonovia ribisnigri* (pucerons de la laitue) / salades / pyréthriinoïdes de synthèse est exposé à un risque de résistance.

Le groupe *Nasonovia ribisnigri* (pucerons de la laitue) / salades / ACHEI est exposé à un risque de résistance.

• NOCTUELLES DEFOLIATRICES



Des dégâts ou des chenilles sont toujours observés sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Torfou (91) (cf. tableau ci-dessous). Le site de Chailly-en-Bière (94) en est exempt.

	Plantes avec des dégâts ou chenille		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	25 %	15 %
91 - TORFOU	0 %	5 %	5 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• MOUCHES MINEUSES, *Lyriomyza spp.*



Des galeries de mouches mineuses ont été observées ces deux dernières semaines à La Houssaye-en-Brie (77) et Torfou (91).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 12 du 25 juin 2026](#).



Galeries mouches mineuses sur laitue (INRAE)

	Plantes avec des galeries		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	15 %	10 %	0 %
91 - TORFOU	10 %	10 %	10 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

• TAUPINS, *Agriotes* spp.

Aucune larve de taupin n'a été relevée dans l'ensemble des parcelles du réseau.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 16 du 23 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible.



• THRIPS

Des thrips ont de nouveau été observés ces deux dernières semaines, sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Torfou (91). Des aleoethrips sont également relevés sur cette dernière parcelle.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 16 du 23 juillet 2026](#).



Dégâts de thrips sur laitue (INRAE)

	Plantes avec présence d'individus		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
94 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	10 %	10 %	25 %
91 - TORFOU	5 %	10 %	5 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

ALEURODES



Aucun individu n'a été observé lors de ces relevés.

A RETENIR

Risque : faible.



Des produits de biocontrôle existent.



Aleurode adulte (INRAE)

MALADIES

• BOTRYTIS, *Botrytis cinerea*



Le site de Chailly-en-Bières (77) présente toujours des symptômes de botrytis cette semaine.

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 04 du 30 avril](#).



Symptôme de botrytis (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

• SCLEROTINIA



Présence de la maladie sur le site de Chailly-en-Bière (77) ces deux dernières semaines sur 8 % des plantes.

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 10 du 11 juin](#).

A RETENIR

Risque : risque lié directement à l'historique parcellaire.



Sclérotinia sur salade (FREDON Ile de France)

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Eviter les fertilisations azotées trop abondantes.

Privilégier l'utilisation de paillage.

Bien drainer le sol pour limiter la stagnation de l'eau.

Eliminer les débris de cultures et plantes atteintes qui constituent une source d'inoculum.



Des produits de biocontrôle existent.

- MILDIOU, *Bremia lactucae***



Des symptômes de mildiou sont toujours observés à La Houssaye-en-Brie (77) cette semaine, sur 5 % des plantes.

Afin d'obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).



Tache de mildiou à la face supérieure d'une feuille (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Favoriser la circulation de l'air et l'assèchement du feuillage : sols bien drainés, sur buttes, sur des sites ensoleillés, sans ombrage ni humidité, bon espacement entre les plants.

Dans la mesure du possible, éviter l'irrigation par aspersion – sinon, l'utiliser en après-midi.

Assurer une fertilisation équilibrée.

Faire une longue rotation des cultures (de plus de 3 ans).

Éliminer les sources d'inoculum (ex. : enfouir les résidus de culture profondément dans le sol immédiatement après la récolte).



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe *Bremia lactucae* (mildiou de la laitue) / salades / Phénylamides (PA) est exposé à un risque de résistance.

TOMATE

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Récolte.

RAVAGEURS

- PUCERONS**



Les infestations de pucerons diminuent ou restent nulles sur la majorité des sites suivis, excepté à Cergy (94) où celles-ci augmentent (cf. tableau ci-dessous).

Des auxiliaires, comme des syrphes, acariens prédateurs et araignées ont été relevées à Périgny (94), Torfou (91) et La Houssaye-en-Brie (77).



Pucerons sur feuille (FREDON Ile de France)

	Niveau d'infestation des plantes					
	Semaine 31			Semaine 32		
	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	95 %	5 %	0 %	100 %	0 %	0 %
94 - PERIGNY	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
95 - CERGY	95 %	5 %	0 %	90 %	10 %	0 %
77 - LA HOUSSEY-EN-BRIE	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré, les conditions météorologiques à venir pourraient permettre leur prolifération.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).



Des produits de biocontrôle existent.


Le groupe pucerons du melon et cotonnier / carbamates est exposé à un risque de résistance.

• MINEUSE DE LA TOMATE, *tuta absoluta*



Un individu a été capturé la semaine dernière sur le site du Mesnil-le-Roi (78). Lors des précédents relevés, un individu avait été capturé sur le site de Torfou (91).

Pour avoir plus d'information sur le cycle et la description de ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche établie par le [SRAL Aquitaine](#) et celle de [FREDON AQUITAINE](#).



Stade adulte (papillon) de *tuta absoluta* (FREDON Ile de France)



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe *tuta absoluta* / Pyridylpyrazoles est exposé à un risque de résistance.

• THRIPS



Aucun individu ou dégât n'a été observé dans l'ensemble des sites du réseau.

Il convient d'être vigilant vis-à-vis de ce ravageur car il peut être vecteur du virus TSWV (maladie bronzée de la tomate). Les dégâts peuvent être très graves, notamment en cas d'infestations précoces. Pour avoir de plus amples informations sur ce virus, vous pouvez consulter la fiche « [Tomato spotted wilt virus \(TSWV\)](#) ».

A RETENIR

Risque : faible. Les conditions météorologiques pourraient continuer d'être favorables à leur développement.

TECHNIQUES ALTERNATIVES :

Mettre en place des pièges englués jaunes ou bleus pour suivre l'apparition du ravageur, les vols et faire du piégeage massif.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• ACARIENS TETRANYQUES

Des acariens tétranyques sont observés à Périgny (94), Le Mesnil-le-Roi (78) et Cergy (95) cette semaine, respectivement sur 1, 10 et 10 % des plantes. Des individus avaient déjà été observés à Périgny (94) et Cergy (95) lors des précédents relevés.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°14 du 9 juillet 2026](#).



Protonympe d'un acarien tétranyque (INRAE)

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe acarien tétranyque / Organophosphorés est exposé à un risque de résistance.

• PUNAISES

Des punaises sont observées sur le site de Cergy (95), sur 5 % des plantes. Aucun individu n'avait été relevé lors des relevés précédents.

Des punaises Nésidiocoris et Nezara sont également relevées sur ce même site.



Nombreuses lésions irrégulières et chlorotiques avec une larve de *Nezara viridula* (D. BLANCARD -INRA)

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter [la fiche PUNAISES EN CULTURES LÉGUMIÈRES de FREDON Nouvelle-Aquitaine](#) ou encore le [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Enlever et détruire les débris végétaux et les résidus de culture.

Désinfecter le matériel utilisé en serre (système goutte-à-goutte, caisses).

Installer des toiles *insect-proof* aux ouvertures des abris.

Désherber la serre et ses abords.

• MOUCHES MINEUSES, *Liriomyza bryoniae*

Des mines de mouches mineuses sont observées à Torfou (91) sur 1 feuille ainsi qu'à La Houssaye-en-Brie (77) sur 3 feuilles.

A RETENIR

Risque : faible à modéré. De plus, les conditions climatiques futures seront propices à leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mouche mineuse de la tomate / Pyridylpyrazoles est exposé à un risque de résistance.



Mine de mouche mineuse des feuilles de la tomate (FREDON Ile-de-France)

• NOCTUELLES DEFOLIATRICES GAMMA

Des dégâts de noctuelles défoliatrices gamma ont été observés à Torfou (91) et La Houssaye-en-Brie (77) cette semaine, respectivement à hauteur d'une et plusieurs feuilles touchées. Lors des relevés précédents, seul le site de La Houssaye-en-Brie (77) était touché.

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe noctuelles défoliatrices gamma de la tomate / pyréthrinoides est exposé à un risque de résistance.



Chenille de noctuelle gamma sur feuille de tomate (FREDON Ile de France)

• ALEURODES

Cette semaine, des aleurodes sont relevés sur 10 % des plantes, à hauteur de 1 à 3 individus, sur le site de La Houssaye-en-Brie (77). Il y a deux semaines, les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et de Torfou (91) en comportaient.

A RETENIR

Risque : faible à modéré.





Des produits de biocontrôle existent.



Les groupes aleurode (culture sous serre) / pyréthrinoïdes / néonicotinoïdes sont exposés à un risque de résistance.

• NOCTUELLES DES FRUITS, *Helicoverpa armigera*



Ces deux dernières semaines on trouve des fruits troués sur les sites de Torfou (91) et La Houssaye-en-Brie (77).

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°12 du 25 juin](#) ou la page [ephytia de l'INRAE](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe noctuelle des fruits de la tomate/ pyréthrinoïdes est exposé à un risque de résistance.

MALADIES

• MILDIOU, *Phytophthora infestans*



Des symptômes de mildiou sont présents sur quelques plantes sur trois sites du réseau cette semaine, contre deux la semaine dernière. Le site de Périgny (94) est toujours exempt de symptôme (cf. tableau ci-dessous).

	Niveau de présence	
	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	Absence	Absence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Quelques plantes avec présence
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence
95 - CERGY	Absence	Quelques plantes avec présence
91 - TORFOU	Quelques plantes avec présence	Absence

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque reste modéré.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mildiou de la laitue / PHENYLAMIDES est exposé à un risque de résistance.

- OÏDIUM - *Pseudoidium neolycopersicii* ou *Leveillula taurica***



La maladie est présente cette semaine sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Torfou (91) (cf. tableau ci-dessous).

	Niveau de présence	
	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	Quelques plantes avec présence	Absence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Quelques plantes avec présence
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence
95 - CERGY	Quelques plantes avec présence	Absence
91 - TORFOU	Absence	> 20 % de plantes

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#). Vous pouvez également consulter la fiche « [L'oïdium de la tomate](#) » de la FDGDON La Réunion.

A RETENIR

Risque : le risque est modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

- BOTRYTIS**



Des symptômes sont toujours présents à Torfou (91) et Périgny (94), comme le montre le tableau ci-dessous.



Symptômes de botrytis sur la face supérieure et face inférieure de la feuille (FREDON Ile de France)

	Niveau d'attaque	
	Semaine 31	Semaine 32
94 - PERIGNY	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tâche	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tâche
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tâche	Absence
91 - TORFOU	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tâche	Quelques feuilles avec 1 tâche ou 2 à 3 chancres
95 - CERGY	Absence	Absence
78 - LE MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence

A RETENIR

Risque : le risque reste modéré.

Pour d'obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 10 du 11 juin](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• CLADOSPORIOSE, *Passalora fulva*



Le site de Périgny (94) possède toujours des plantes avec des symptômes de cladosporiose.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).



Symptômes de cladosporiose sur une feuille de tomate (FREDON Ile de France)



Des produits de biocontrôle existent.

• ALTERNARIOSE, *Alternaria tomatophila*



La maladie n'a pas été observée ces deux dernières semaines. Lors des relevés précédents, il y avait des symptômes à Torfou (91).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 16 du 23 juillet 2026](#).



Lésions d'alternariose sur tomate (INRAE)



Des produits de biocontrôle existent.

CHOU

2 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES


12 à 18 feuilles étalées à début pommaison.

RAVAGEURS

• ALTISES, *Phyllotreta spp.*



Les infestations d'altises sont en diminution ces deux dernières semaines sur les deux parcelles suivies.



Altises sur chou (FREDON Ile de France)

	Abondance moyenne par pied		
	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32
77 - LA-HOUSSAYE-EN-BRIE	> 20 individus	1 à 5 individus	1 à 5 individus
94 - PERIGNY	6 à 20 individus	1 à 5 individus	1 à 5 individus

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible pour les choux ayant atteint le stade 6 feuilles. Pour les choux dont le stade est inférieur à 6 feuilles, le risque est très important.

Stade de sensibilité : jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 1 altise par plante.

• MOUCHE DU CHOU, *Delia radicum*



Aucun œuf n'a été piégé sur les quatre dernières semaines.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible.

Seuil indicatif de risque : 2 œufs / piège / semaine.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Bâcher les plantations pour limiter les pontes aux pieds des plants.

Biner permet de contrôler la mouche du chou : la bineuse détruira les œufs de mouches ou les remontera à la surface où ils se dessècheront.



Des produits de biocontrôle existent.

• ALEURODES, *Brevicoryne brassicae*



5 % des plantes à La Houssaye-en-Brie (77) présentent moins de 10 individus adultes.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).



Aleurode (adultes et œufs)
(FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 10 % de pieds avec plus de 10 aleurodes.



Des produits de biocontrôle existent.

- **CHARANÇONS DU CHOU, *Ceutorhynchus assimilis***



Aucun individu n'est observé depuis trois semaines dans l'ensemble des sites suivis.

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#)

A RETENIR

Risque : faible.



Galles du charançon gallicole du chou (INRAE)



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.



La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous <https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>.

Les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : <http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraîchage : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html>, <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>.

- **Observations** : FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France.
- **Rédaction** : FREDON Ile de France – Antoine DHENIN.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France, SRAL.