



N° 22
03/0926

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Fraise : présence de thrips, d'acariens, de punaises et de noctuelles défoliatrices. Des drosophiles *suzukii* sont toujours capturées.

Laitue : des mouches mineuses, des noctuelles défoliatrices et des thrips sont toujours présents. Des symptômes de botrytis et de sclérotinia sont relevés sur un site.

Tomate : la pression mildiou et oïdium est en augmentation. Aucun dégât de *Tuta absoluta* observé malgré quelques captures.

Chou : présence de chenilles de la piéride de la rave ainsi que d'œufs de la mouche du chou. Des aleurodes et altises sont toujours présents.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94)

	jeu. 3	ven. 4	sam. 5	dim. 6	lun. 7	mar. 8	mer. 9
	0	0	0	0	0	0.5	0
	56 / 93	49 / 99	23 / 78	36 / 70	36 / 100	24 / 68	32 / 61
	15 / 26	17 / 27	19 / 30	18 / 26	14 / 30	19 / 29	16 / 23

FRAISE

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Fraises hors-sols sous abri : fruits rouges à récolte.

RAVAGEURS

• Pucerons



Des pucerons sont observés ces quinze derniers jours uniquement à La Houssaye-en-Brie (77) (cf. tableau ci-dessous). Des chrysopes sont observées à Villeroy (77).

	Pieds touchés		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	0 %	10 %	5 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	0 %	0 %
77 - VILLEROY	0 %	0 %	0 %

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Pour avoir plus d'informations sur les pucerons des fraisiers, consultez la fiche « [Ravageur : les pucerons en culture de fraisier sous abris](#) » du CTIFL. Vous pouvez aussi consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible. Les conditions météorologiques seront favorables à son développement.

Seuil indicatif de risque : 5 individus pour 10 feuilles.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• Thrips



Des thrips sont présents sur tous les sites suivis alors que la semaine dernière, seul un site était touché (cf. tableau ci-dessous).

	Semaine 35		Semaine 36	
	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	0,1	25 %	0,3
94 - PERIGNY	0 %	0	5 %	1 à 3
77 - VILLEROY	0 %	0	1 %	0,05

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par fleur.

• Acariens



Des acariens sont présents sur les sites de Périgny (94) et Villeroy (77) depuis trois semaines alors que le site de La Houssaye-en-Brie (77) reste indemne.

	Pieds touchés		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	10 %	1 %	10 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	0 %	0 %
77 - VILLEROY	50 %	30 %	55 %



Toile liée à la présence d'acarien sur fraisier (FREDON Ile de France)

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est modéré. Les conditions météorologiques continueront d'être favorables à son développement.

Seuil indicatif de risque : 5 formes mobiles par feuille.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe acarien / fruits rouges / ACHEI (organophosphorés) est exposé à un risque de résistance.

• Punaises, *Lygus spp.*



Cette semaine, les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Villeroy (77) présentent des fruits déformés par des punaises depuis les derniers relevés ; une augmentation de dégâts est observée sur deux des trois sites suivis (cf. tableau ci-dessous).



Dégâts de punaises (FREDON Ile de France)

	Pieds touchés par des déformations de fruits		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	0 %	25 %
77 - VILLEROY	15 %	15 %	20 %

Pour avoir de plus amples informations, consulter [« LES PUNAISES EN CULTURE DE FRAISES : ELEMENTS DE RECONNAISSANCE »](#) de FREDON Haut-de-France.

A RETENIR

Surveillez l'évolution des populations et l'émergence de jeunes larves dans vos cultures afin de détecter les premiers individus, ou à défaut les premiers dégâts.

• Drosophiles, *Drosophila suzukii*



Des drosophiles ont été capturées à La Houssaye-en-Brie (77) et à Villeroy (77) avec une légère augmentation cette semaine. Le site de Périgny (94) en est toujours exempt.



Dégâts de drosophiles sur fraise avec une larve.

	Mâles capturés		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	6	3	13
94 - PERIGNY	0	0	0
77 - VILLEROY	3	3	6

Pour avoir plus d'information sur la drosophile suzukii, consultez la fiche [drosophile suzukii](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n°8 du 28 mai 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIES

• BOTRYTIS, *Botrytis cinerea*



Cette semaine, des symptômes de botrytis sont observés à Villeroy (77) et La Houssaye-en-Brie (77), avec respectivement 25 % et 15 % des fruits touchés.

Pour obtenir des détails à propos de cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°06 du 13 mai](#).



fruits (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques ne devraient pas être propices à son développement.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Aérer les abris limite son développement.

METHODES ALTERNATIVES :

Nettoyer les plants de leurs vieilles feuilles améliore la circulation de l'air au niveau des cœurs et réduit ainsi l'humidité

Eliminer les fruits ou toute partie touchés limite la prolifération de la maladie.



Des produits de biocontrôle existent.

• Noctuelles défoliatrices



Des dégâts frais de noctuelles sont toujours observés cette semaine à Villeroy (77) et La Houssaye-en-Brie (77).

	Dégâts frais de noctuelles		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	0 %	0 %	0%
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	5 %	10 %
77 - VILLEROY	20 %	0 %	10 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est toujours faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

12 à 18 feuilles à 50 % de sa masse foliaire.

RAVAGEURS

• Noctuelles défoliatrices



Les infestations de noctuelles défoliatrices sont stables à Torfou (91) alors qu'à La Houssaye-en-Brie (77), elles sont en augmentation (cf. tableau ci-dessous).

	Plantes avec des dégâts ou chenille		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
77 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	5 %	15 %	10 %
91 - TORFOU	5 %	5 %	5 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions continueront d'être propices à son développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• Mouches mineuses, *Lyriomyza spp.*



Des galeries de mouches mineuses sont observées à Torfou (91) et à La Houssaye-en-Brie (77) sur 5 % des pieds.

	Plantes avec des galeries		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
77 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	0 %	5 %
91 - TORFOU	10 %	0 %	5 %



Galeries mouches mineuses sur laitue (INRAE)

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 12 du 25 juin 2026](#)

A RETENIR

Risque : faible.

• Thrips



Les infestations de thrips augmentent cette semaine avec deux parcelles touchées à hauteur de 20 à 30 % de pieds infestés (cf. tableau ci-dessous).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 16 du 23 juillet 2026](#).

	Plantes avec présence d'individus		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
77 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	0 %	20 %
91 - TORFOU	15 %	30 %	30 %

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré car les conditions météorologiques continueront d'être propices à leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIES

• Botrytis, *Botrytis cinerea*



Des symptômes de botrytis sont toujours présents sur le site de Chailly-en-Bière (77).

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).



Symptôme de botrytis
(FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• Sclerotinia



La maladie est présente sur 5 % des pieds depuis trois semaines sur le site de Chailly-en-Bière (77).

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).



Sclerotinia sur salade (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : risque lié directement à l'historique parcellaire.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV n°4 du 30 avril 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• Mildiou, *Bremia lactucae*

Aucun symptôme de la maladie n'a été observé dans le réseau ces deux dernières semaines

Afin d'obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible.



supérieure d'une feuille (FREDON Ile de France)

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°18 du 6 août 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe *Bremia lactucae* (mildiou de la laitue) / salades / Phénylamides (PA) est exposé à un risque de résistance.

TOMATE

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Fruits rouges à récolte.

RAVAGEURS

• Pucerons



La pression des pucerons est en légère hausse : trois sites présentent désormais des infestations, contre deux il y a quinze jours (cf. tableau ci-dessous). Toutefois, le niveau d'infestation demeure faible, avec au maximum 10 % des plantes hébergeant tout au plus de dix pucerons.

Des araignées auxiliaires sont observées à Périgny (94), La Houssaye-en-Brie (77) et Torfou (91). A Cergy (95) et Le Mesnil-le-Roi (78), des cécidomyies du pucerons, *Aphidoletes Aphidimyza*, sont notées.

	Niveau d'infestation des plantes					
	Semaine 35			Semaine 36		
	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	95 %	5 %	0 %	95 %	5 %	0 %
94 - PERIGNY	100 %	0 %	0 %	90 %	10 %	0 %
95 - CERGY	95 %	5 %	0 %	95 %	5 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	90 %	10 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré, les conditions météorologiques à venir pourraient permettre leur prolifération.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe pucerons du melon et cotonnier / carbamates est exposé à un risque de résistance.

• Mineuses de la tomate, *Tuta absoluta*



Deux individus ont été capturés cette semaine sur le site de La Houssaye-en-Brie (77). Lors des relevés précédents, un individu était capturé au Mesnil-le-Roi (78).

Aucun dégât n'a été observé ces deux dernières semaines.

Pour avoir plus d'information sur le cycle et la description de ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche établie par le [SRAL Aquitaine](#) et celle de [FREDON AQUITAINE](#).



Stade adulte (papillon) de *tuta absoluta* (FREDON Ile de France)



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe *tuta absoluta* / Pyridylpyrazoles est exposé à un risque de résistance.

• Thrips



Cette semaine seuls quelques fruits piqués sont signalés au Mesnil-le-Roi (78). Les autres sites en sont exempts.

Il convient d'être vigilant vis-à-vis de ce ravageur car il peut être vecteur du virus TSWV (maladie bronzée de la tomate). Les dégâts peuvent être très graves, notamment en cas d'infestations précoces. Pour avoir de plus amples informations sur ce virus, vous pouvez consulter la fiche « [Tomato spotted wilt virus \(TSWV\)](#) ».

A RETENIR

Risque : le risque faible à modéré. Les conditions météorologiques vont être propices à leur prolifération.

TECHNIQUES ALTERNATIVES :

Mettre en place des pièges englués jaunes ou bleus pour suivre l'apparition du ravageur, les vols et faire du piégeage massif.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• Acariens tétranyques



Les infestations d'acariens sont en régression. Aucun foyer n'a été observé cette semaine. La semaine précédente, sur les cinq sites suivis, trois présentaient au maximum 5 % de plantes infestées, avec moins de 10 acariens par plante (cf. tableau ci-dessous).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°14 du 9 juillet 2026](#).

	Niveau d'infestation des plantes					
	Semaine 35			Semaine 36		
	Absence d'acarien	< 10 acariens	10 à 100 acariens	Absence d'acarien	< 10 acariens	10 à 100 acariens
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	95 %	5 %	0 %	100 %	0 %	0 %
94 - PERIGNY	99 %	1 %	0 %	100 %	0 %	0 %
95 - CERGY	95 %	5 %	0 %	100 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques sont propices à leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe acarien tétranyque / Organophosphorés est exposé à un risque de résistance.

• Punaïses



Aucune punaise ni aucun dégât lié à cette dernière n'ont été observés au cours des 15 derniers jours. Lors des précédents relevés, des punaises Nésidiocoris avaient été relevées sur un des sites.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter [la fiche PUNAISES EN CULTURES LÉGUMIÈRES de FREDON Nouvelle-Aquitaine](#) ou encore le [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).



Nombreuses lésions irrégulières et chlorotiques avec une larve de *Nezara viridula* (D. BLANCARD -INRA)

A RETENIR

Risque : faible.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°10 du 11 juin 2026](#).

• Mouches mineuses, *Liriomyza bryoniae*



Des mines de mouches mineuses ont été observées la semaine dernière à Cergy (95) sur 1 à 2 feuilles. Cette semaine, aucune mine n'est observée dans les différents sites suivis.



Mine de mouche mineuse des feuilles de la tomate (FREDON Ile-de-France)

A RETENIR

Risque : faible.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mouche mineuse de la tomate / Pyridylpyrazoles est exposé à un risque de résistance.

• Noctuelles défoliatrices gamma



Ces deux dernières semaines, quelques rares dégâts de noctuelles défoliatrices ont été observés (cf. tableau ci-dessous).

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#).



feuille de tomate (FREDON Ile de France)

	Niveau de présence de chenilles ou dégâts		
	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
91 - TORFOU	Absence	Absence	Absence
78 - LE MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence	Absence
94 - PERIGNY	Plusieurs feuilles touchées	1 feuille touchée	1 feuille touchée
95 - CERGY	1 feuille touchée	Absence	Absence
77 - LA HOUSSEY-EN-BRIE	Absence	1 feuille touchée	1 feuille touchée

A RETENIR

Risque : faible.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe noctuelles défoliatrices gamma de la tomate / pyréthriinoïdes est exposé à un risque de résistance.

• Aleurodes



La présence d'aleurodes est en légère augmentation depuis quinze jours. La semaine dernière, un seul site présentait des infestations, avec 1 à 3 individus recensés sur 10 % des plantes. Cette semaine, deux sites sont concernés (cf. tableau ci-dessous).

	Pourcentage de plantes avec aleurodes							
	Semaine 35				Semaine 36			
	Absence	1 à 3 individus	4 à 30 individus	> 30 individus	Absence	1 à 3 individus	4 à 30 individus	> 30 individus
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
94 - PERIGNY	100 %	0 %	0 %	0 %	90 %	10 %	0 %	0 %
95 - CERGY	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSEY-EN-BRIE	90 %	10 %	0 %	0 %	75 %	20 %	5 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque est faible mais les conditions météorologiques pourraient permettre une augmentation des infestations.



Des produits de biocontrôle existent.

Les groupes aleurode (culture sous serre) / pyréthriinoïdes / néonicotinoïdes sont exposés à un risque de résistance.

• Noctuelles des fruits, *Helicoverpa armigera*



Des fruits troués ont été relevés sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77), Cergy (95) et Le Mesnil-le-Roi (78) cette semaine alors que la semaine dernière, seul le site de Torfou (91) était touché avec 1 à 2 fruits perforés.

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#) ou la page [ephytia de l'INRAE](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe noctuelle des fruits de la tomate/ pyréthrinoides est exposé à un risque de résistance.

MALADIES

• Mildiou, *Phytophthora infestans*



Des symptômes de mildiou sont présents sur deux sites du réseau cette semaine (cf. tableau ci-dessous). La pression reste la même dans la majorité des parcelles.

	Niveau de présence			
	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	Absence	Absence	Absence	Absence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Quelques plantes avec présence	Absence	Absence
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Absence	Quelques plantes avec présence
95 - CERGY	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence
91 - TORFOU	Quelques plantes avec présence	Absence	Absence	Absence

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe mildiou de la laitue / PHENYLAMIDES est exposé à un risque de résistance.

• Oïdium, *Pseudoidium neolycopersicii* ou *Leveillula taurica*



La pression en oïdium augmente cette semaine dans la majorité des sites suivis. En effet, la maladie est présente dans quatre parcelles, avec davantage de symptômes relevés. Seul le site de Périgny (94) en est exempt cette semaine (cf. tableau ci-dessous).



Symptômes d'oïdium sur feuille de tomate (FREDON Ile de France)

	Niveau de présence			
	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	Absence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Absence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Quelques plantes avec présence	> 40 % de plantes	> 20 % de plantes	> 40 % de plantes
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence	Absence	Quelques plantes avec présence
95 - CERGY	Absence	Absence	Absence	Quelques plantes avec présence
91 - TORFOU	> 20 % de plantes	> 40 % de plantes	> 20 % de plantes	> 20 % de plantes

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).
 Vous pouvez également consulter la fiche « [L'oïdium de la tomate](#) » de la FDGDON La Réunion.

A RETENIR

Risque : le risque devient modéré à important. Les conditions météorologiques pourraient favoriser sa prolifération.



Des produits de biocontrôle existent.

• Botrytis, *botrytis cinerea*



Aucune évolution de l'infestation de botrytis n'a été observée au cours des quinze derniers jours. Seuls les sites de Périgny (94) et de Torfou (91) présentent des feuilles symptomatiques (cf. tableau ci-dessous).



Symptômes de botrytis sur la face supérieure et face inférieure de la feuille (FREDON Ile de France)

	Niveau d'attaque			
	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
94 - PERIGNY	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Absence	Absence	Absence
91 - TORFOU	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres
95 - CERGY	Absence	Absence	Absence	Absence
78 - LE MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence	Absence	Absence

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Pour d'obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 10 du 11 juin](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• Cladosporiose, *Passalora fulva*



Des plantes présentant la maladie sont toujours présentes à Périgny (94) ces quinze derniers jours.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).



Symptômes de cladosporiose sur une feuille de tomate (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

CHOU

2 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

12 à 18 feuilles étalées à mi-pomaison.

RAVAGEURS

• Altises, *Phyllotreta* spp.



Les infestations d'altises se maintiennent dans le réseau d'observation. Depuis quinze jours, une parcelle touchée est recensée chaque semaine.

	Abondance moyenne par pied			
	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
77 - LA-HOUSSAYE-EN-BRIE	1 à 5 individus	1 à 5 individus	Absence	1 à 5 individus
94 - PERIGNY	1 à 5 individus	Absence	1 à 5 individus	Absence

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consultez le [BSV maraichage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible pour les choux ayant atteint le stade 6 feuilles. Pour les choux dont le stade est inférieur à 6 feuilles et que le nombre d'altise moyen par plante dépasse 1, le risque est important.

Stade de sensibilité : jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 1 altise par plante.

- Mouches du chou, *Delia radicum*



Cette semaine, des œufs de mouche du chou ont été observés à La Houssaye-en-Brie (77), avec une moyenne de 4 œufs par piège et par semaine. Ce niveau dépasse le seuil indicatif de risque.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.

Seuil indicatif de risque : 2 œufs / piège / semaine.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

- Aleurodes, *Brevicoryne brassicae*



Moins de 10 individus sont relevés sur 5 % des plantes à La Houssaye-en-Brie (77) cette semaine et 45 % la semaine dernière.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).



(FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : le risque reste faible à modéré, mais les conditions météorologiques futures pourraient être favorables à leur développement.

Seuil indicatif de risque : 10 % de pieds avec plus de 10 aleurodes.




Des produits de biocontrôle existent.

- PIERIDE DU CHOU / PIERIDE DE LA RAVE



Ponte de piéride du chou (FREDON Ile de France)

L'adulte a des ailes blanches avec des taches noires sur les bords antérieurs. Les larves ont une tête noire à l'avant, grise à l'arrière avec une plaque thoracique noire. Leur corps est vert grisâtre avec 3 lignes longitudinales jaunes, de nombreuses soies et des petites taches noires. Les chenilles dévorent les feuilles des crucifères, ne laissant parfois que les grosses nervures. En outre, leurs excréments, délayés par la pluie ou la rosée, s'accumulent dans le cœur de la plante et la rendent immangeable.



Chenilles de piéride du chou (en bas) et de piéride de la rave (en haut) (FREDON Ile de France)

Contrairement à la noctuelle du chou (*Mamestra brassicae*) qui attaque les feuilles du cœur de la plante, les piérides attaquent les feuilles dégagées.

La semaine dernière, des chenilles de la piéride de la rave ont été observées à La Houssaye-en-Brie (77).

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré. Toutefois, il est primordial de réaliser des observations dans vos parcelles sur les faces inférieures des feuilles.

Seuil indicatif de risque : dès l'apparition des premières chenilles.



Des produits de biocontrôle existent.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraîchage. :
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html>,
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

- **Observations** : FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction** : FREDON Ile de France – Antoine DHENIN, Céline GUILLEM.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.