



N° 23

17/09/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Fraise : les infestations de la majorité des ravageurs sont à la baisse à l'exception de la drosophile suzukii. L'oïdium fait son apparition alors que les symptômes de botrytis sont absents.

Laitue : des noctuelles défoliatrices sont toujours observées mais la pression diminue tout comme celle des pucerons. Quelques symptômes de botrytis peuvent s'observer.

Tomate : les niveaux d'infestation de l'oïdium demeurent élevés, tandis que ceux du mildiou et du botrytis restent stables. Une capture de *Tuta absoluta* enregistrée mais aucun dégât observé. La pression des autres ravageurs est faible.

Chou : quelques chenilles de la piéride de la rave et de la noctuelle gamma sont observées tout comme des œufs de la mouche du chou, des aleurodes et des pucerons verts.

Cresson : des pucerons verts sont observés, ainsi que des larves de chironomes et des chrysomèles. Pour la première fois, la présence de punaises des céréales et les dégâts associés sont signalés sur cresson de fontaine.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94)

	jeu. 17	ven. 18	sam. 19	dim. 20	lun. 21	mar. 22	mer. 23
	0	0	0	0	0	0	0
	45 / 94	41 / 79	33 / 78	47 / 100	40 / 92	38 / 76	34 / 73
	11 / 21	12 / 21	12 / 25	13 / 24	11 / 24	13 / 24	11 / 24

FRAISE

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Fraises hors-sols sous abri : fruits rouges à arrêt de la culture

RAVAGEURS

• Pucerons



Au cours des quinze derniers jours, aucun puceron n'a été observé sur les sites du réseau de surveillance (voir le tableau ci-dessous). En revanche, des chrysopes ont été signalées à La Houssaye-en-Brie (77).

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
de la France

OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

	Pieds touchés		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	5 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	0 %	0 %	0 %
77 - VILLEROY	0 %	0 %	

Pour avoir plus d'informations sur les pucerons des fraisiers, consultez la fiche « [Ravageur : les pucerons en culture de fraisier sous abris](#) » du CTIFL. Vous pouvez aussi consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul.

Seuil indicatif de risque : 5 individus pour 10 feuilles.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• Thrips



Après une présence généralisée sur l'ensemble des sites du réseau la semaine dernière, les observations de thrips sont en diminution. Seul le site de Périgny (94) présente encore une infestation très faible (cf. tableau ci-dessous).

	Semaine 37		Semaine 38	
	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)	Pieds touchés	Individus par fleur (moy.)
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	10 %	1 à 3	0 %	0
94 - PERIGNY	5 %		1 %	
77 - VILLEROY	20 %	1 à 3		

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consultez le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul compte tenu du stade des cultures.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par fleur.

• Acariens



La pression des acariens est globalement en diminution sur les sites suivis. Une forte baisse est observée à Périgny (94), tandis qu'une faible infestation apparaît à La Houssaye-en-Brie (77). Le site de Villeroy (77) reste le plus touché.

	Pieds touchés		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	10 %	10 %	1 %
77 - LA HOUSSEY-EN-BRIE	0 %	0 %	5 %
77 - VILLEROY	55 %	35 %	



Toile liée à la présence d'acarien sur fraisier (FREDON Ile de France)

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré. Les conditions météorologiques continueront d'être favorables à son développement.

Seuil indicatif de risque : 5 formes mobiles par feuille.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe acarid / fruits rouges / ACHEI (organophosphorés) est exposé à un risque de résistance.

• Punaises, *Lygus spp.*



Des déformations de fruits sont signalées sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et de Villeroy (77), avec une diminution de la proportion de pieds touchés au cours des dernières semaines. Aucun symptôme n'est observé à Périgny (94) (cf. tableau ci-dessous).

Des punaises ont été observées la semaine dernière à Villeroy (77) et à La Houssaye-en-Brie (77).



Dégâts de punaises (FREDON Ile de France)

	Pieds touchés par des déformations de fruits		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSEY-EN-BRIE	25 %	15 %	10 %
77 - VILLEROY	20 %	5 %	

Pour avoir de plus amples informations, consulter « [LES PUNAISES EN CULTURE DE FRAISES : ELEMENTS DE RECONNAISSANCE](#) » de FREDON Haut-de-France.

A RETENIR

Surveillez l'évolution des populations et l'émergence de jeunes larves dans vos cultures afin de détecter les premiers individus, ou à défaut les premiers dégâts.

• Drosophiles, *Drosophila suzukii*



Les captures de drosophiles se maintiennent dans deux sites (cf. tableau ci-dessous). A La Houssaye-en-Brie (77), des dégâts sur fruits sont également observés cette semaine.

	Mâles capturés		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	13	30	13
94 - PERIGNY	0		
77 - VILLEROY	6	11	8



Dégâts de drosophiles sur fraise avec une larve.

Pour avoir plus d'information sur la drosophile suzukii, consultez la fiche [drosophile suzukii](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n°8 du 28 mai 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

• Noctuelles défoliatrices



La présence de noctuelles et de dégâts frais est toujours signalée à La Houssaye-en-Brie (77). À Villeroy (77), des dégâts ont également été observés la semaine dernière, témoignant du maintien de l'activité du ravageur sur ces deux sites.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est toujours faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIES

• BOTRYTIS, *Botrytis cinerea*



Des symptômes de botrytis avaient été relevés la semaine dernière à La Houssaye-en-Brie (77) et à Villeroy (77), affectant respectivement 5 % et 20 % des fruits observés. Lors des relevés de cette semaine, aucun symptôme n'a été détecté sur les sites suivis.

Pour obtenir des détails à propos de cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°06 du 13 mai](#).



Symptômes de botrytis sur fruits (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques ne devraient pas être propices à son développement.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Aérer les abris limite son développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• OÏDIUM, *Podosphaera aphanis*

Des symptômes d'oïdium sur fruits ont été observés à La Houssaye-en-Brie (77) sur 15 % des pieds la semaine dernière, et sur 25 % cette semaine.

Pour en savoir plus, consultez [BSV maraichage N°06 du 13 mai](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré, les conditions météorologiques à venir pourraient être favorables à son développement.



Oïdium sur fraises (FREDON Ile de France)

METHODES ALTERNATIVES :

Supprimer et détruire les feuilles et les fruits touchés permet de limiter la prolifération de la maladie dès les premières taches.

Aérer les abris permet de limiter son développement



Des produits de biocontrôle existent.

LAITUE

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

50 % de sa masse foliaire à récolte.

RAVAGEURS

• Noctuelles défoliatrices



Après un pic d'activité observé en semaine 37 à La Houssaye-en-Brie (77) et à Torfou (91), la pression des noctuelles est en diminution en semaine 38. Des dégâts ou des chenilles restent toutefois présents sur ces deux sites (cf. tableau ci-dessous).

	Plantes avec des dégâts ou chenille		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
77 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	10 %	40 %	10 %
91 - TORFOU	5 %	30 %	15 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions continueront d'être propices à son développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• Mouches mineuses, *Lyriomyza spp.*



Ces quinze derniers jours, aucune galerie de mineuse n'a été observée sur les parcelles du réseau. Il y a quinze jours, des galeries avaient été observées à Torfou (91) et à La Houssaye-en-Brie (77) sur 5 % des pieds.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 12 du 25 juin 2026](#)

A RETENIR

Risque : nul.

• Thrips



Après des niveaux d'infestation parfois élevés en semaine 37, notamment à La Houssaye-en-Brie (77), aucun thrips n'a été observé en semaine 38 sur les sites suivis. La pression apparaît ainsi en nette diminution sur l'ensemble du réseau (cf. tableau ci-dessous).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 16 du 23 juillet 2026](#).

	Plantes avec présence d'individus		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
77 – CHAILLY-EN-BIERE	0 %		
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	20 %	50 %	0 %
91 - TORFOU	30 %	20 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque est faible voire nul.



Des produits de biocontrôle existent.

• PUCERONS, *Nasonovia ribisnigri*



Au cours des quinze derniers jours, des pucerons ont été observés uniquement à Torfou (91) touchant 10 % des pieds la semaine dernière et 5 % cette semaine. Nous notons également la présence d'auxiliaires, notamment des coccinelles, sur ce même site.

A RETENIR

Risque : le risque est faible. Les conditions météorologiques à venir pourraient permettre leur développement.

Seuil indicatif de risque : 10 % des pieds avec au moins 1 aptère.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage n° 04 du 30 avril](#).

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n°04 du 30 avril](#).



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe *Nasonovia ribisnigri* (pucerons de la laitue) / salades / pyréthriinoïdes de synthèse est exposé à un risque de résistance.

Le groupe *Nasonovia ribisnigri* (pucerons de la laitue) / salades / ACHEI est exposé à un risque de résistance.

• LIMACES



Des limaces ont été observées sur feuilles cette semaine uniquement à La Houssaye-en-Brie (77).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraichage N°06 du 13 mai](#).



Limace sur salade (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible mais la pression pourrait augmenter lors des périodes d'irrigation des parcelles.



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIES

• Botrytis, *Botrytis cinerea*



Des symptômes de botrytis sont toujours présents sur le site de Chailly-en-Bière (77).

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 04 du 30 avril](#).



Symptôme de botrytis (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

• Sclérotinia

Des symptômes ont été observés la semaine dernière à Chailly-en-Bière (77) sur 5 % des pieds. Aucun symptôme n'a été relevé lors des observations réalisées cette semaine.

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraichage n° 10 du 11 juin](#).



A RETENIR

Risque : risque lié directement à l'historique parcellaire.

Sclérotinia sur salade (FREDON Ile de France)

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV n°4 du 30 avril 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

TOMATE

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Fruits rouges à récolte.

RAVAGEURS

• Pucerons



Les infestations sont en recul par rapport aux observations réalisées il y a quinze jours. Seules 5 à 10 % des plantes sont touchées sur deux sites du réseau, contre trois sites lors du précédent relevé (voir tableau ci-dessous).

	Niveau d'infestation des plantes					
	Semaine 37			Semaine 38		
	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie	Absence de puceron	10 pucerons isolés	Au moins une colonie
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	100 %	0 %	0 %	90 %	5 %	5 %
94 - PERIGNY	95 %	5 %	0 %	100 %	0 %	0 %
95 - CERGY	95 %	5 %	0 %	95 %	5 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe pucerons du melon et cotonnier / carbamates est exposé à un risque de résistance.

• Mineuses de la tomate, *Tuta absoluta*


Cette semaine, une seule capture a été enregistrée à La Houssaye-en-Brie (77), alors qu'aucun individu n'avait été piégé lors du précédent relevé. Aucun dégât n'a toutefois été observé au cours des deux dernières semaines.

Pour avoir plus d'information sur le cycle et la description de ce ravageur, vous pouvez consulter la fiche établie par le [SRAL Aquitaine](#) et celle de [FREDON AQUITAINE](#).



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe *tuta absoluta* / Pyridilpyrazoles est exposé à un risque de résistance.



Stade adulte (papillon) de *tuta absoluta* (FREDON Ile de France)

• Thrips

Au cours des quinze derniers jours, seul le site de Cergy (95) a été concerné. La semaine dernière, quelques fruits présentaient des piqûres, tandis que cette semaine, seuls quelques individus ont été observés.

Il convient d'être vigilant vis-à-vis de ce ravageur car il peut être vecteur du virus TSWV (maladie bronzée de la tomate). Les dégâts peuvent être très graves, notamment en cas d'infestations précoces. Pour avoir de plus amples informations sur ce virus, vous pouvez consulter la fiche « [Tomato spotted wilt virus \(TSWV\)](#) ».

A RETENIR

Risque : le risque faible à modéré. Les conditions météorologiques vont être propices à leur prolifération.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• Acariens tétranyques

Quelques acariens sont encore observés à Périgny (94), seul site concerné au cours des quinze derniers jours. Toutefois, les infestations sont en régression (cf. tableau ci-dessous).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°14 du 9 juillet 2026](#).

	Niveau d'infestation des plantes					
	Semaine 37			Semaine 38		
	Absence d'acarien	< 10 acariens	10 à 100 acariens	Absence d'acarien	< 10 acariens	10 à 100 acariens
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
94 - PERIGNY	95 %	5 %	0 %	99 %	1 %	0 %
95 - CERGY	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe acarien tétranyque / Organophosphorés est exposé à un risque de résistance.

• Noctuelles défoliatrices gamma

La présence de chenilles défoliatrices demeure globalement faible sur le réseau d'observation. Les observations restent limitées à de faibles niveaux d'attaque même si 3 des 5 sites sont affectés cette semaine (cf. tableau ci-dessous).

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#).



Chenille de noctuelle gamma sur feuille de tomate (FREDON Ile de France)

	Niveau de présence de chenilles ou dégâts		
	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
91 - TORFOU	Absence	Absence	1 feuille avec au moins une chenille ou un dégât
78 - LE MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence	Absence
94 - PERIGNY	1 feuille touchée	Absence	Absence
95 - CERGY	Absence	Absence	1 feuille avec au moins une chenille ou un dégât
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 feuille touchée	Plusieurs feuilles avec des chenilles ou des dégâts	1 feuille avec au moins une chenille ou un dégât

A RETENIR

Risque : le risque est faible.



Des produits de biocontrôle existent.

Le groupe noctuelles défoliatrices gamma de la tomate / pyréthriinoïdes est exposé à un risque de résistance.

• Aleurodes



Cette semaine, seul le site de La Houssaye-en-Brie (77) présente une légère infestation (cf. tableau ci-dessous).

	Pourcentage de plantes avec aleurodes							
	Semaine 37				Semaine 38			
	Absence	1 à 3 individus	4 à 30 individus	> 30 individus	Absence	1 à 3 individus	4 à 30 individus	> 30 individus
91 - TORFOU	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
78 - LE MESNIL-LE-ROI	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
94 - PERIGNY	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
95 - CERGY	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	100 %	0 %	0 %	0 %	85 %	15 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : le risque est faible.



Des produits de biocontrôle existent.

• Noctuelles des fruits, *Helicoverpa armigera*



Des fruits troués ont été relevés sur les sites de La Houssaye-en-Brie (77) et Cergy (95) ces deux dernières semaines.

Pour obtenir des détails à propos de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage N°12 du 25 juin](#) ou la page [ephytia de l'INRAE](#).

A RETENIR

Risque : faible.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe noctuelle des fruits de la tomate / pyréthriinoïdes est exposé à un risque de résistance.

MALADIES

• Mildiou, *Phytophthora infestans*



Les infestations de mildiou restent stables par rapport aux observations réalisées il y a 15 jours. Deux sites présentent toujours quelques plantes touchées.

	Niveau de présence			
	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	Absence	Absence	Absence	Absence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Absence	Absence	Absence
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Absence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence
95 - CERGY	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence	Quelques plantes avec présence
91 - TORFOU	Absence	Absence	Absence	Absence

Pour obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 04 du 30 avril](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mildiou de la laitue / PHENYLAMIDES est exposé à un risque de résistance.

- **Oïdium, *Pseudoidium neolycopersicii* ou *Leveillula taurica***



La pression de l'oïdium est en hausse cette semaine. Quatre sites sont désormais touchés, dont deux présentent des attaques importantes, contre seulement deux sites affectés lors du précédent relevé (cf. tableau ci-dessous).



Symptômes d'oïdium sur feuille de tomate (FREDON Ile de France)

	Niveau de présence			
	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	Quelques plantes avec présence	Absence	Absence	Quelques plantes avec présence
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	> 20 % de plantes	> 40 % de plantes	> 40 % de plantes	> 40 % de plantes
78 - LE-MESNIL-LE-ROI	Absence	Quelques plantes avec présence	Absence	Absence
95 - CERGY	Absence	Quelques plantes avec présence	Absence	Quelques plantes avec présence
91 - TORFOU	> 20 % de plantes	> 20 % de plantes	> 40 % de plantes	> 40 % de plantes

Pour avoir des informations sur cette maladie, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#). Vous pouvez également consulter la fiche « [L'oïdium de la tomate](#) » de la FDGDON La Réunion.

A RETENIR

Risque : le risque est modéré à important. Les conditions sous-abri est favorable à son développement.



Des produits de biocontrôle existent.

- **Botrytis, *botrytis cinerea***



La situation reste stable vis-à-vis du botrytis depuis le précédent relevé. Des symptômes foliaires sont uniquement observés sur les sites de Périgny (94) et de Torfou (91) (cf. tableau ci-dessous).



Symptômes de botrytis sur la face supérieure et face inférieure de la feuille (FREDON Ile de France)

	Niveau d'attaque			
	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
94 - PERIGNY	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	Absence	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache
77 - LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	Absence	Absence	Absence
91 - TORFOU	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres	1 chancre sur tige ou 1 feuille avec au moins une tache	Quelques feuilles avec 1 tache ou 2 à 3 chancres
95 - CERGY	Absence	Absence	Absence	Absence
78 – LE MESNIL-LE-ROI	Absence	Absence	Absence	Absence

A RETENIR

Risque : le risque est faible à modéré.

Pour d'obtenir davantage de détails sur cette maladie, vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n° 10 du 11 juin](#).



Des produits de biocontrôle existent.

- **Cladosporiose, *Passalora fulva***



Cette semaine des symptômes sont toujours observés sur quelques plantes à Périgny (94).

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur cette maladie, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°14 du 9 juillet 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque est faible.



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

Début pommaison à récolte.

RAVAGEURS

- Altises, *Phyllotreta spp.*



Les infestations d'altises sont en diminution dans les parcelles (cf. tableau ci-dessous).

Pour obtenir davantage d'informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°04 du 30 avril](#).

	Abondance moyenne par pied			
	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38
77 - LA-HOUSSAYE-EN-BRIE	Absence	1 à 5 individus	1 à 5 individus	Absence
94 - PERIGNY	1 à 5 individus	Absence	Absence	

A RETENIR

Risque : le risque est faible quel que soit le stade du chou.

Stade de sensibilité : jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 1 altise par plante.

- Mouches du chou, *Delia radicum*



Cette semaine des œufs de mouche du chou ont été observés à La Houssaye-en-Brie (77), avec une moyenne de 1,1 œufs par piège et par semaine. La semaine dernière, aucun œuf n'avait été signalé.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible voire nul.

Seuil indicatif de risque : 2 œufs / piège / semaine.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Vous pouvez vous référer au [BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).



Des produits de biocontrôle existent.

- Aleurodes, *Brevicoryne brassicae*



Seul le site de La Houssaye-en-Brie (77) présente des infestations d'aleurodes. La proportion de pieds touchés a fortement augmenté, passant de 5 % la semaine dernière à 90 % cette semaine. Toutefois, l'intensité de l'attaque reste faible, avec moins de 10 individus observés par pied.

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°8 du 28 mai 2026](#).



Aleurode (adultes et œufs)
(FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : le risque reste faible.

Seuil indicatif de risque : 10 % de pieds avec plus de 10 aleurodes.



Des produits de biocontrôle existent.

- Chenilles défoliatrices



Cette semaine, des chenilles de la piéride de la rave ont été observées sur 5% des pieds à La Houssaye-en-Brie (77). La semaine dernière, sur cette même parcelle des chenilles de la noctuelle gamma (*Autographa gamma*) avaient été observées.

Les dégâts occasionnés par la noctuelle gamma sont semblables à ceux provoqués par la piéride du chou et la piéride de la rave, à savoir des défoliations grossières du limbe.



Chenilles de noctuelle gamma (FREDON
Ile de France)



Chenilles de piéride du chou (en bas) et de piéride
de la rave (en haut) (FREDON Ile de France)

Pour avoir des informations sur la piéride la rave, vous pouvez consulter [le BSV maraîchage n°22 du 03 septembre 2026](#)

A RETENIR

Risque : le risque est modéré. Toutefois, il est primordial de réaliser des observations dans vos parcelles sur les faces inférieures des feuilles.

Seuil indicatif de risque : dès l'apparition des premières chenilles.



Des produits de biocontrôle existent.

• PUCERONS VERTS



Des pucerons verts ont été observés la semaine dernière à La Houssaye-en-Brie (77) sur 5% des pieds.

A RETENIR

Risque : faible voir nul.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

CRESSON

5 SITES OBSERVES DANS LE RESEAU

RAVAGEURS

• Chironomes



L'insecte de petite taille (de 2 à 10 mm) ressemble à un moustique ayant des antennes plumeuses pour les mâles mais ne piquant pas. La femelle est plus petite, plus claire, avec des antennes plumeuses visibles uniquement à la loupe binoculaire. Ils volent en groupe, en formant des nuées au-dessus ou près de l'eau. La femelle pond en volant au ras de l'eau. Ces insectes pondent préférentiellement dans les eaux courantes (rivières, ruisseaux, canaux). Les pontes forment des rubans gélatineux, translucides jaunâtres ou légèrement orangés de centaines d'œufs. Ces rubans sont collés à la berge ou en périphérie d'un objet flottant ou émergeant de l'eau.

Il n'y a pas de nuisance directe de ce ravageur mais une dépréciation des bottes et la peur du consommateur les confondant avec la douve. Leur présence importante peut également induire une augmentation du nombre de lavages avant la vente.

Cette semaine, des nuées d'adultes ont été observées au-dessus des bassins sur l'ensemble des sites suivis. Toutefois, l'intensité des vols varie fortement selon les secteurs. Sur certains sites, les chironomes sont très abondants, avec de nombreuses nuées omniprésentes tourbillonnant au-dessus des bassins. À l'inverse, d'autres sites ne présentent qu'une faible activité, limitée à quelques individus isolés, sans formation de véritables nuées.

Des larves ont été observées dans les bassins avec des infestations allant de 20 à 50 % de pieds touchés en moyenne. Nous notons toutefois une hétérogénéité des observations dans les bassins suivis, entre autres liés au stade végétatif de la culture peu avancé.



Larves de chironomes (FREDON Ile de France)



Note	Nombre de larves de chironomes			
	S 38			
	0	1	2	3
MOIGNY S/ECOLE	65 %	30 %	5 %	0 %
MAISSE	50 %	40 %	10 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	80 %	20 %	0 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	100 %	0 %	0 %	0 %
MEREVILLE	70 %	30 %	0 %	0 %

Note : 0 : aucune larve

1 : entre 1 et 3 larves par pied

2 : entre 4 et 8 larves par pied

3 : plus de 8 larves par pied

A RETENIR

Risque : le risque est modéré. Les conditions météorologiques annoncées dans les prochains jours pourraient permettre le survol des chironomes adultes au-dessus des bassins et d'éventuelles pontes.

Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds touchés avec au moins une larve.

• Chrysomèle du cresson, *Phaedon cochleariae*

La chrysomèle est un coléoptère arrondi de couleur métallique bleuâtre ou violet sur le dessus, noir sous le dessous. Les élytres sont finement ponctués de lignes, ayant une fossette près de leur bord externe, et une petite callosité à leur base. Les antennes sont rouges à la base.

Les larves émergentes se nourrissent de la sève et dégradent les feuilles, rendant le cresson impropre à la vente.

En cas de forte pullulation, les dégâts sont non négligeables.



Chrysomèle du cresson (FREDON Ile de France)

Cette semaine, une parcelle fait état de la présence d'adultes, de larves et de dégâts ; deux autres cressonnières sont touchées par des larves de chrysomèle et les deux dernières en sont indemnes (voir le tableau ci-dessous).

	Semaine 38		
	% des pieds avec des larves de chrysomèle	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts
MOIGNY S/ECOLE	10 %	5 %	5 %
MAISSE	0 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	5 %	0 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	7 %	0 %	0 %
MEREVILLE	0 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré selon les cressonnières. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

• Pucerons



Nous trouvons principalement *Myzus persicae* (puceron vert) mais aussi en moindre fréquence des pucerons noirs comme *Aphis fabae* et des pucerons cendrés comme *Brevicoryne brassicae*.

Le principal dégât est la crispation des feuilles et des tiges, entraînant une dépréciation du cresson à la vente. Ils peuvent être vecteurs de maladies comme le virus de la mosaïque.

La transmission du virus peut se faire même avec de faibles populations de pucerons, si leur présence perdure dans le temps.



Pucerons verts à la face inférieure d'une feuille de cresson (FREDON Ile de France)

Cette semaine, seul le site de Méréville ne présente aucune infestation de pucerons verts. Pour les autres sites, les infestations varient entre 5 et 10 % de pieds touchés en moyenne (voir le tableau ci-dessous).

	Semaine 38	
	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de puerons verts par pied
CHALO-SAINT-MARS	7 %	0,33
COURANCES	10 %	0,33
D'HUISON-LONGUEVILLE	5 %	0,05
LE MÉRÉVILLOIS	0 %	0
MAISSE	10 %	0,15

A RETENIR

Risque : faible à modéré, peu d'individu pour le moment observé. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin car une **présence même faible durant plus de 10 jours peut induire un risque de virose.**

• Punaise des céréales, *Nysius cymoides*



Les punaises des céréales sont des insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent en prélevant la sève des végétaux. Bien qu'elles soient principalement associées aux cultures céréalières, elles peuvent occasionnellement être observées sur d'autres plantes lors de déplacements depuis les parcelles voisines, notamment après les récoltes.

Un contexte estival chaud et sec constitue un facteur favorable à l'activité des punaises. La surveillance doit être renforcée lorsque cette situation climatique s'installe durablement entre juillet et septembre.

Pour avoir d'avantage d'information, consultez [l'article de Terres Inovia](#).



Punaises des céréales sur cresson avec les premiers dégâts (FREDON Ile de France)



Dégâts plus développés de punaises des céréales sur cresson (FREDON Ile de France)

Des punaises des céréales ont été observées dans plusieurs cressonnières, avec la présence de dégâts dans certaines parcelles (cf. le tableau ci-dessous).

	Semaine 38	
	Présence de punaise des céréales	Dégâts liés aux punaises des céréales
CHALO-SAINT-MARS	Oui	Non
COURANCES	Non	Non
D'HUISON-LONGUEVILLE	Oui	Oui
LE MÉRÉVILLOIS	Oui	Oui
MAISSE	Oui	Non

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraîchage. :
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html>,
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

- **Observations** : FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction** : FREDON Ile de France – Antoine DHENIN, Céline GUILLEM.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.