



N° 25

15/10/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Ile de France
Maraîchage

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Écologie
Développement
Durabilité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



Cresson : les infestations de pucerons verts poursuivent leur progression, tout comme celles des chrysomèles, des chenilles défoliatrices et des punaises des céréales. Les infestations de chironomes sont, quant à elles, en augmentation. Des symptômes de mildiou sont également observés.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94)

	jeu. 15	ven. 16	sam. 17	dim. 18	lun. 19	mar. 20	mer. 21
	0	0.2	0	0	0.7	1.7	2.9
	55 / 86	57 / 100	44 / 84	47 / 92	54 / 90	50 / 97	45 / 92
	14 / 23	11 / 21	8 / 16	5 / 14	7 / 17	8 / 20	10 / 18

CRESSON

5 SITES OBSERVES DANS LE RESEAU

RAVAGEURS

• Chironome



Cette semaine, l'ensemble des cressonnières ont enregistré des vols de chironomes. Comme lors des relevés précédents, l'intensité des colonies au-dessus des bassins est variable, allant de quelques individus isolés au-dessus des bassins à la présence de nuées de faibles intensités au-dessus des bassins.

L'ensemble des cressonnières présente des infestations de larves de chironomes cette semaine, avec des taux moyens allant de 5 à 55 % de pieds touchés. La pression larvaire est en augmentation dans la majorité des sites suivis cette semaine (voir le tableau ci-dessous).



Adulte de chironomes sur une feuille de cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

Pour plus d'informations, consultez le [BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026](#).

Note	Nombre de larves de chironomes							
	S 40				S 42			
	0	1	2	3	0	1	2	3
MOIGNY-SUR-ECOLE	95 %	5 %	0 %	0 %	75 %	25 %	0 %	0 %
MAISSE	76 %	24 %	0 %	0 %	65 %	35 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	55 %	35 %	10 %	0 %	45 %	45 %	10 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	95 %	5 %	0 %	0 %	95 %	5 %	0 %	0 %
MEREVILLE	90 %	10 %	0 %	0 %	65 %	30 %	5 %	0 %

Note : 0 : aucune larve

1 : entre 1 et 3 larves par pied


2 : entre 4 et 8 larves par pied

3 : plus de 8 larves par pied

Des chironomes adultes ont été piégés dans toutes les cressonnières suivies, avec une hétérogénéité entre les sites observés, mais aussi entre les bassins d'un même site.

	Nombre moyen de chironomes capturés par semaine dans les cuvettes	
	Semaine 40	Semaine 42
MOIGNY-SUR-ECOLE	2,33	7
MAISSE	12	5,5
D'HUISON-LONGUEVILLE	77,5	21,3
CHALO-SAINT-MARS	5,5	1
MEREVILLE	14,5	24,3

Comparativement aux années précédentes, le nombre d'individus capturés cette semaine est supérieur à celui de toutes les autres années, à l'exception de l'automne 2008, référence haute (voir le graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque reste modéré, plusieurs bassins dépassent le seuil de risque. Les prévisions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.

Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds touchés avec au moins une larve.

• Chrysomèle du cresson, *Phaedon cochleariae*

Par rapport au précédent relevé, la présence de larves et d'adultes est globalement en diminution sur le réseau, cette semaine, à l'exception de Chalo-Saint-Mars, où la pression larvaire progresse. Malgré ce recul des populations observées, les dégâts augmentent dans la plupart des cressonnières. Aucun dégât ni individu n'ont été observés à Méréville (cf. tableau ci-dessous).

Pour plus d'informations, consultez le [BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026](#).



Chrysomèle du cresson et dégâts foliaires associés (FREDON Ile de France)

	Semaine 40			Semaine 42		
	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts
MOIGNY-SUR-ECOLE	27 %	27 %	8,33 %	10 %	0 %	50 %
MAISSE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	10 %	7,5 %	8,75 %	5 %	5 %	15 %
CHALO-SAINT-MARS	5 %	10 %	6,25 %	15 %	5 %	25 %
MEREVILLE	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré selon les cressonnières. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

• Puceron



Les populations de pucerons verts sont en recul dans la majorité des cressonnières du réseau. La proportion de pieds infestés diminue sur les sites de Moigny-sur-École, Méréville et de Maisse. À Chalo-Saint-Mars, aucun puceron n'est désormais observé. L'intensité des infestations baisse également. Les populations restent faibles et localisées sur l'ensemble du réseau (voir tableau ci-dessous).

Des crispations foliaires liées à la présence de pucerons verts ont été notées à Moigny-sur-Ecole dans un des bassins suivis.



Pucerons verts sur cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

Pour plus d'informations, consultez le [BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026](#).

	Semaine 40		Semaine 42	
	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied
CHALO-SAINT-MARS	5 %	0,45	0 %	0
MOIGNY-SUR-ECOLE	27 %	5,9	15 %	0,2
D'HUISON-LONGUEVILLE	0 %	0	0 %	0
LE MÉRÉVILLOIS	15 %	0,35	5 %	0,05
MAISSE	24 %	0,25	15 %	0,4

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin car une **présence même faible durant plus de 10 jours peut induire un risque de virose**.

• Punaie des céréales, *Nysius cymoides*



Après avoir été observées dans plusieurs cressonnières et avoir occasionné des dégâts dans certains bassins lors du précédent relevé, **les punaises des céréales se sont montrées beaucoup plus discrètes cette semaine**. Des dégâts n'ont en effet été signalés que dans un seul des bassins suivis à Chalo-Saint-Mars (voir tableau ci-dessous).

Pour avoir d'avantage d'information, consultez [l'article de Terres Inovia](#).



Dégâts occasionnés par des dégâts de punaises des céréales (FREDON Ile de France)

	Semaine 40		Semaine 42	
	Présence de punaise des céréales	Dégâts liés aux punaises des céréales	Présence de punaise des céréales	Dégâts liés aux punaises des céréales
CHALO-SAINT-MARS	Oui	Oui	Non	Oui
MOIGNY-SUR-ECOLE	Non	Non	Non	Non
D'HUISON-LONGUEVILLE	Oui	Oui	Non	Non
LE MÉRÉVILLOIS	Oui	Non	Non	Non
MAISSE	Non	Non	Non	Non

• Chenille défoliatrice et tenthrède



Cette semaine, aucune chenille n'a été observée dans les cressonnières du réseau. Lors du précédent relevé, des chenilles de piéride de la rave avaient toutefois été signalées sur deux sites.

En revanche, des papillons de piéride ont été observés en vol au-dessus des bassins de D'Huisson-Longueville, témoignant du maintien de l'activité de ce ravageur.



Morsures d'altises sur cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

Pour plus d'informations sur les différentes espèces visibles sur le cresson de fontaine, consultez le [BSV maraîchage n°24 du 1er octobre 2026](#).

A RETENIR

Risque : faible. Il est primordial néanmoins de rester vigilant et de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

- **Altise, *Phyllotreta* spp et *Psylliodes chrysocephala***

Cette semaine, des grosses altises ainsi que les dégâts associés ont été observés dans l'ensemble des cressonnières suivies. Les intensités d'attaque varient de 10 à 25 % de pieds touchés selon les bassins. Toutefois, les morsures restent limitées et ne concernent qu'une faible proportion de la surface foliaire.

Pour plus d'informations, consultez le [BSV maraîchage n°24 du 1er octobre 2026](#).



Morsures d'altises sur cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : au regard des stades observés sur le cresson, le risque est faible.

METHODES ALTERNATIVES

La gestion des populations peut reposer sur l'élévation temporaire du niveau d'eau et l'écumage des insectes flottants.

MALADIES

- **Mildiou, *Peronospora brassicae***

De petites taches jaunes brunes apparaissent sur le dessus des feuilles inférieures, s'élargissent ensuite et finissent par être marbrées d'un grand nombre de points noirs grisâtres. Ce sont les fructifications du champignon *Peronospora brassicae*. C'est la projection de ces spores qui peut contaminer les autres feuilles.

Un duvet blanc apparaît sur la face inférieure de la feuille par temps humide.

Les attaques surviennent lorsque le temps est frais et humide

Cette semaine, des symptômes ont été signalés dans plusieurs cressonnières à Méréville et à Maisse. Toutefois, l'observation est restée ponctuelle, avec un seul bassin faiblement touché sur chaque site.



Symptômes de mildiou à la face supérieure d'une feuille de cresson (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible. Les conditions météorologiques sont actuellement peu propices à son développement. Néanmoins, les conditions météorologiques pourraient devenir propices à son développement à partir de la semaine avec les baisses de températures annoncées.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraîchage. :
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html>,
<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

- **Observations** : FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction** : FREDON Ile de France – Céline GUILLEM, Antoine DHENIN.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.