Bulletin de Santé du végétal



Ile de France

Maraîchage

N° 26
29/10/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Cresson : les populations de pucerons verts et de chironomes se maintiennent dans le réseau de surveillance, tandis que celles des chrysomèles du cresson sont en recul. Quelques chenilles défoliatrices ainsi que des altises et leurs dégâts associés sont également observés, mais à de faibles niveaux.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94)

	jeu. 29	ven. 30	sam. 31	dim. 1	lun. 2	mar. 3	mer. 4
	0	0	0	0	0	0	0
	65 / 92	52 / 92	61 / 100	67 / 96	76 / 99	63 / 95	58 / 88
	6 / 14	5 / 14	5 / 14	4 / 12	5 / 11	6 / 10	5 / 9

CRESSON

5 SITES OBSERVES DANS LE RESEAU

RAVAGEURS

• Chironome

RISQUE FAIBLE — RISQUE FORT

Cette semaine, l'ensemble des cressonnières a enregistré des vols de chironomes. Comme lors des relevés précédents, l'intensité des colonies au-dessus des bassins est variable, allant de quelques individus isolés au-dessus des bassins à la présence de nuées de faibles intensités.



Adulte de chironomes sur une feuille de cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

L'ensemble des cressonnières présente des infestations de larves de chironomes cette semaine, avec des taux moyens allant de 5 à 45 % de pieds touchés. Par rapport au précédent relevé, la pression larvaire est en recul dans trois cressonnières et en augmentation dans les deux autres (voir tableau ci-dessous).

Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos


	Nombre de larves de chironomes							
	S 42				S 44			
Note	0	1	2	3	0	1	2	3
MOIGNY-SUR-ECOLE	75 %	25 %	0 %	0 %	85 %	10 %	0 %	5 %
MAISSE	65 %	35 %	0 %	0 %	95 %	5 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	45 %	45 %	10 %	0 %	50 %	30 %	20 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	95 %	5 %	0 %	0 %	80 %	20 %	0 %	0 %
MEREVILLE	65 %	30 %	5 %	0 %	55 %	45 %	0 %	0 %

Note : 0 : aucune larve
1 : entre 1 et 3 larves par pied
2 : entre 4 et 8 larves par pied
3 : plus de 8 larves par pied

Depuis le dernier relevé, les captures de chironomes en cuvette augmentent dans la plupart des cressonnières suivies. Le site de Maisse fait exception, avec une baisse du nombre d'individus piégés. Des adultes sont présents dans l'ensemble du réseau de surveillance, mais les niveaux de capture demeurent hétérogènes, tant entre les sites qu'entre les bassins d'une même exploitation.

	Nombre moyen de chironomes capturés par semaine dans les cuvettes	
	Semaine 42	Semaine 44
MOIGNY-SUR-ECOLE	7	11.75
MAISSE	5,5	3,5
D'HUISON-LONGUEVILLE	21,3	62,5
CHALO-SAINT-MARS	1	22,5
MEREVILLE	24,3	45

Comparativement aux années précédentes, le nombre d'individus capturés cette semaine est supérieur à celui de toutes les autres années, à l'exception de l'automne 2008, référence haute (voir le graphique ci-dessous).



A RETENIR

Risque : le risque reste modéré, plusieurs bassins dépassent le seuil de risque. Les prévisions météorologiques futures pourraient permettre leur développement.

Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds touchés avec au moins une larve.

• Chrysomèle du cresson, *Phaedon cochleariae*



Une diminution de la présence des larves et des adultes est observée sur l'ensemble du réseau par rapport au précédent relevé. Les niveaux de dégâts suivent la même tendance à la baisse (cf. tableau ci-dessous).
Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.

	Semaine 42			Semaine 44		
	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts
MOIGNY-SUR-ECOLE	10 %	0 %	50 %	5 %	0 %	0 %
MAISSE	0 %	0 %	5 %	5 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	5 %	5 %	15 %	0 %	0 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	15 %	5 %	25 %	0 %	0 %	0 %
MEREVILLE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

• Puceron



La proportion moyenne de pieds touchés diminue légèrement depuis le précédent relevé, passant de 7 % à 6 %, tandis que le nombre moyen de pucerons par pied recule. Malgré l'apparition ou la progression des pucerons sur certains sites, les niveaux observés restent très faibles et témoignent d'une pression globalement limitée. Néanmoins sur certains sites, leur présence est observée depuis plus de 10 jours augmentant ainsi le risque virose.
On notera également la présence de pucerons noirs à Méréville dans un des bassins suivis avec 0,2 individus/par pieds en moyenne.

Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.

	Semaine 42		Semaine 44	
	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied
CHALO-SAINT-MARS	0 %	0	10 %	0,1
MOIGNY-SUR-ECOLE	15 %	0,2	5 %	0,05
D'HUISON-LONGUEVILLE	0 %	0	0 %	0
LE MÉRÉVILLOIS	5 %	0,05	10 %	0,1
MAISSE	15 %	0,4	5 %	0,05

A RETENIR

Risque : modéré. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin car une **présence même faible durant plus de 10 jours peut induire un risque de virose.**

• Punaise des céréales, *Nysius cymoides*



Après avoir été observées dans plusieurs cressonnières et avoir occasionné des dégâts lors des précédents relevés, aucune punaise des céréales n'a été observée sur les sites du réseau cette semaine. Aucun dégât n'a également été signalé (voir tableau ci-dessous).

Pour avoir d'avantage d'information, consultez l'article de Terres Inovia.

• Chenille défoliatrice et tenthrède



Cette semaine, des chenilles défoliatrices ont été observées sur deux sites du réseau, à Maisse et à Moigny-sur-École, avec 5 % de pieds touchés. Dans les deux cas, un seul bassin est concerné. Aucun signalement n'avait été effectué lors du précédent relevé.

Pour plus d'informations sur les différentes espèces visibles sur le cresson de fontaine, consultez le BSV maraichage n°24 du 1er octobre 2026.



Chenille de la piéride de la rave sur cresson (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible. Il est primordial néanmoins de rester vigilant et de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

• Altise, *Phyllotreta spp* et *Psylliodes chrysocephala*



Des morsures de grosses altises ont été observées dans l'ensemble des cressonnières du réseau. La proportion de pieds touchés est en hausse avec des taux d'infestation compris entre 20 et 35 %, contre 10 à 25 % en semaine précédente. Toutefois, les dégâts restent limités, les morsures n'affectant qu'une faible part de la surface foliaire, généralement inférieure à 2 %.
Quelques altises ont été capturées dans les cuvettes sur la majorité des sites suivis. Seul le site de Moigny-sur-École n'a enregistré aucune capture.



Morsures d'altises sur cresson de fontaine (FREDON Ile de France)

Pour plus d'informations, consultez le BSV maraichage n°24 du 1er octobre 2026.

A RETENIR

Risque : au regard des stades observés du cresson, le risque est faible.

METHODES ALTERNATIVES

La gestion des populations peut reposer sur l'élévation temporaire du niveau d'eau et l'écumage des insectes flottants.

MALADIES

• Mildiou, *Peronospora* brassicae



Aucun symptôme de mildiou n'a été observé cette semaine sur les sites du réseau. Lors du précédent relevé, des symptômes avaient été signalés à Méréville et à Maisse, où un seul bassin faiblement touché était recensé sur chacun des sites.

A RETENIR

Risque : faible. Néanmoins, les conditions météorologiques pourraient devenir propices à son développement à partir de la semaine avec les baisses de températures annoncées.

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraichage. : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html, https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html

- **Observations :** FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction :** FREDON Ile de France – Céline GUILLEM, Antoine DHENIN.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.
