

Bulletin de Santé du végétal

Ile de France

Maraîchage

N° 28
26/11/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Cresson : les infestations des larves de chironomes sont en progression. La pression du mildiou s'accentue.

METEO

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE
STATION DE PERIGNY (94)

	jeu. 26	ven. 27	sam. 28	dim. 29	lun. 30	mar. 1	mer. 2
	0	0	0	2.4	0	0	0
	84 / 98	80 / 96	88 / 100	90 / 100	85 / 100	78 / 96	84 / 100
	0 / 5	-2 / 2	-1 / 4	3 / 7	3 / 6	3 / 7	3 / 8

CRESSON

5 SITES OBSERVES DANS LE RESEAU

STADES

Certains bassins ont atteint 100 % de leur masse foliaire alors que d'autres ont déjà eu une coupe. La grande majorité des bassins est voilé ou bien les voiles sont en cours de pose.

RAVAGEURS

• Chironome

RISQUE FAIBLE — RISQUE FORT

Cette semaine, seul le site de Méréville a présenté une faible présence de chironomes, avec seulement quelques individus observés et sans formation de véritables nuées. À l'inverse, lors du précédent relevé, des vols de chironomes avaient été enregistrés dans la majorité des cressonnières.

Cette semaine, toutes les cressonnières présentent une infestation au-dessus du seuil indicatif de risque et, pour certains bassins, les infestations peuvent atteindre plus de 8 larves par pied (voir tableau ci-dessous).

Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.



Larves de chironomes sur cresson (FREDON Ile de France)

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

	Nombre de larves de chironomes							
	S 46				S 48			
Note	0	1	2	3	0	1	2	3
MOIGNY-SUR-ECOLE	90 %	10 %	0 %	0 %	60 %	30 %	10 %	0 %
MAISSE	85 %	15 %	0 %	0 %	75 %	25 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	35 %	60 %	5 %	0 %	50 %	35 %	15 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	80 %	15 %	5 %	0 %	50 %	35 %	10 %	5 %
MEREVILLE	45 %	45 %	0 %	10 %	35 %	45%	15 %	0 %

Note : 0 : aucune larve

1 : entre 1 et 3 larves par pied

2 : entre 4 et 8 larves par pied

3 : plus de 8 larves par pied

En rouge, le seuil indicatif de risque est dépassé pour ce site.
En vert, le seuil indicatif de risque est n'est pas dépassé pour ce site

Les captures de chironomes en cuvette diminuent dans toutes les cressonnières suivies.

	Nombre moyen de chironomes capturés par semaine dans les cuvettes	
	Semaine 46	Semaine 48
MOIGNY-SUR-ECOLE	46,3	29,5
MAISSE	57,5	12,75
D'HUISON-LONGUEVILLE	112,5	90
CHALO-SAINT-MARS	20,8	5,75
MEREVILLE	70	14

Comparativement aux années précédentes, le nombre d'individus capturés cette semaine est supérieur à l'automne 2016, inférieur à 2022 et 2024 et quasiment identique à 2023 et 2025 (voir le graphique ci-dessous).



RETENIR

Risque : important d'autant plus que la pose des voiles d'hivernage permet de maintenir les populations de chironomes en-dessous.

Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds touchés avec au moins une larve.

• Chrysomèle du cresson, *Phaedon cochleariae*



Cette semaine, aucun dégât ni aucun individu n'ont été observées dans les bassins suivis. Lors du précédent relevé, quelques larves et quelques dégâts avaient été observés à Chalo-Saint-Mars (91) (cf. tableau ci-dessous).

Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.

	Semaine 46			Semaine 48		
	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts	% des pieds avec des larves	% des pieds avec des adultes	% de pieds avec des dégâts
MOIGNY-SUR-ECOLE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MAISSE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	5 %	0 %	1,3 %	0 %	0 %	0 %
MEREVILLE	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

A RETENIR

Risque : nul.

• Puceron



Aucun individu n'a été observé lors des relevés effectués cette semaine (voir tableau ci-dessous). Toutefois, des crispations foliaires sont toujours visibles à Moigny-sur-École et à D'Huison-Longueville. Ces symptômes sont vraisemblablement liés aux infestations de pucerons observées au cours des semaines précédentes.

Pour plus d'informations, consultez le BSV Maraîchage n° 23 du 17 septembre 2026.

	Semaine 44		Semaine 46	
	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied	Pucerons verts - % de pieds touchés	Nombre moyen de pucerons verts par pied
CHALO-SAINT-MARS	10 %	0,1	0 %	0
MOIGNY-SUR-ECOLE	5 %	0,05	0 %	0
D'HUISON-LONGUEVILLE	0 %	0	0 %	0
LE MÉRÉVILLOIS	10 %	0,1	0 %	0
MAISSE	5 %	0,05	0 %	0

A RETENIR

Risque : faible. Il reste primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin car une présence même faible durant plus de 10 jours peut induire un risque de virose.

• Mouche du cresson, Hydrellia Nasturtii et Hydrellia sp.



Cette semaine, aucune pupe n'a été observée, contrairement au relevé précédent où elles avaient été signalées à D'Huison-Longueville sur 10 % des pieds observés.

A RETENIR

Risque : faible voire nul.

MALADIES

• Mildiou, *Peronospora* brassicae



Des symptômes de mildiou sont observés cette semaine sur les sites de Méréville, Chalo-Saint-Mars et Maisse à hauteur de 20 % de pieds touchés. Lors du précédent relevé, des symptômes avaient été notés à Méréville et Chalo-Saint-Mars.

Les attaques de mildiou ont lieu lorsque le temps est frais et humide. De petites taches jaune-brun apparaissent d'abord sur le dessus des feuilles inférieures puis s'étendent ensuite et finissent par être marbrées d'un grand nombre de points noirs grisâtres. Un duvet blanc apparaît sur l'envers de la feuille par temps humide. Il y a sporulation abondante et propagation rapide de la maladie avec une humidité relative supérieure à 98 %, notamment lorsque les feuilles sont mouillées, et à une température située entre 8 et 16°C.



A gauche, début des symptômes à la face supérieure des feuilles. A droite, duvet blanc observable à la face inférieure des feuilles (FREDON Ile de France).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques actuelles, avec des températures inférieures à 8 °C, sont peu favorables à son développement. Néanmoins, la mise en place des voiles d'hivernage, déjà réalisée ou prévue prochainement, pourrait créer un microclimat plus propice à son développement**.**

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière maraichage. : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html, https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html

- **Observations :** FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction :** FREDON Ile de France – Céline GUILLEM, Antoine DHENIN.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.