



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Île de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

POMME DE TERRE : aucun risque mildiou. Des symptômes ont été observés. Les infestations de pucerons et de doryphores demeurent présentes mais ont nettement diminué.

OIGNON : aucun risque mildiou. Présence de thrips sans néanmoins dépasser le seuil indicatif de risque.

FRAISE : botrytis observé. Aucun risque d'oïdium. Des captures de drosophiles suzukii ont eu lieu. Des thrips, acariens et pucerons ont été observés.

SALADE : les infestations de pucerons ailés ont progressé. Aucun symptôme de botrytis. Du mildiou a été observé.

TOMATE : des pucerons, thrips et des dégâts d'oiseaux sont signalés. Des symptômes d'oïdium, de botrytis et de cladosporiose ont été observés.

CHOU : les altises sont encore présentes cette semaine. Les aleurodes et les œufs de la piéride du chou sont à surveiller.

Station de Périgny (94) :

	mer. 9	jeu. 10	ven. 11	sam. 12	dim. 13	lun. 14	mar. 15
	0	0	0	0	0	0	0
	39 / 92	35 / 78	40 / 83	39 / 82	28 / 78	28 / 75	29 / 74
	11 / 24	13 / 27	15 / 28	16 / 28	16 / 29	17 / 34	20 / 29

Source : Sencrop, modèle METEOBLUE.

CURTOBACTERIUM FLACCUMFACCIENS

Retrouvez en cliquant sur [ce lien](#) une fiche sur *Curto bacterium flaccumfacciens*, un organisme nuisible réglementé, à surveiller notamment en cultures maraîchères. En cas de suspicion, contactez le pôle phytosanitaire :

sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr



Curto bacterium flaccumfacciens (INRAE)

STADES

Maturation des fruits à récolte.

MALADIES

• Mildiou



Des précipitations ont été enregistrées la semaine dernière sur toutes les stations météorologiques. Compte tenu des conditions météorologiques de la semaine passée et des faibles réserves de spores, aucune contamination n'a été enregistrée dans la région.

Les réserves de spores sont faibles pour tous les postes météorologiques.

Des symptômes de mildiou ont été observés cette semaine à Villeron (95) où quelques pieds isolés présentent des symptômes sans sporulation. À Méréville (91) les observations font état de plants contaminés de manière éparse dans la parcelle.

Stations météorologiques	Jours où le seuil indicatif de risque a été			Réserves de spores au 08/07	Seuil indicatif de risque atteint			Pluies depuis le 01/07
	variété sensible	variété intermédiaire	variété résistante		Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
77-Chailly en Brie				faible	non	non	non	29,8
77-Fay les Nemours				faible	non	non	non	2,5
77-Nangis				faible	non	non	non	18,1
78-Boissy sans avoir				faible	non	non	non	25,9
78-Ménerville				faible	non	non	non	32,3
78-Orsonville				faible	non	non	non	32,3
91-Etampes				faible	non	non	non	23,5
95-Vémars				faible	non	non	non	32,2
95-Villiers-en-Arthies				faible	non	non	non	24,1

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n'est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d'orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, il ne prend pas en compte l'irrigation, il n'est valable que pour des parcelles non irriguées.

A RETENIR

Risque : le risque est nul pour toute la région car les réserves de spores sont faibles.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Pour que **le seuil indicatif de risque** soit atteint, il faut que :

- le potentiel de sporulation soit atteint :

Moyen pour les variétés sensibles,

Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires,

Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes,

- et que les conditions météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21°C durant 6h consécutives ou supérieures à 15°C pendant 8 heures.

- si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez la fiche "[modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre](#)". Elle décrit entre autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV

MESURES PROPHYLACTIQUES

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.



LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / OPUC (fluazinam) EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE MILDIOU / POMME DE TERRE / RNAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

• *Alternaria, Alternaria solani*



Cette semaine, des symptômes supposés d'alternariose ont été observés à Torfou (91) et à La Houssaye-en-Brie (77).

Pour avoir plus d'information sur la maladie, consultez [le BSV grandes cultures n°19 du 17 juin 2025](#).

A RETENIR

Risque : modéré. Le risque pourrait augmenter avec les pluies orageuses qui ont lieu dans la semaine.



Des produits de biocontrôle existent

• PUCERONS



Cette semaine, certains sites sont infestés par les populations de pucerons (voir le tableau ci-dessous). Nous notons néanmoins une baisse de la pression parasitaire dans toutes les parcelles.

Des auxiliaires, notamment des coccinelles, ont été observés dans certaines des parcelles du réseau (voir le tableau ci-dessous).



Puceron sur face inférieure d'une foliole de pomme de terre (FREDON Ile de France)

	% de folioles avec pucerons		Auxiliaires
	Semaine 27	Semaine 28	
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1 à 10	1 à 10	Coccinelles
77- PUISIEUX	Absence	Absence	Absence
77-SAINT-SOUPPLETS	Absence	Absence	Absence
77- PIERRE-LEVÉE	Absence		
95-VILLERON	Absence	Absence	Absence
91- LE MÉRÉVILLOIS	1 à 10	1 à 10	Coccinelles
91-TORFOU	1 à 10	Absence	Coccinelles

Pour avoir des informations sur les pucerons, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 07 mai 2025](#).

Rappel de la méthode de notation :

La notation se fait sur une foliole qui touche la foliole de l'extrémité sur 40 pieds différents pris au hasard en diagonale de la parcelle.



A RETENIR

Risque : faible. Aucune parcelle n'a dépassé le seuil indicatif de risque mais encore quelques auxiliaires sont présents.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 20 folioles porteuses de pucerons aptères sur 40 folioles observées soit 50 % des folioles notées.



Des produits de biocontrôle existent.

RAVAGEURS

DORYPHORE



La pression exercée par les doryphores a diminué dans la majorité des parcelles suivies cette semaine (voir tableau ci-dessous).



Doryphore adulte (FREDON Ile de France)

	Semaine 27	Semaine 28
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	Plusieurs foyers et/ou nombreuses larves et adultes disséminés dans la parcelle	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
77- PUISIEUX	Absence	Absence
77-SAINT-SOUPPLETS	Absence	Absence
77- PIERRE-LEVEE	Absence	
95-VILLERON	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
91- LE MÉRÉVILLOIS	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle	Un foyer et/ou quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle
91-TORFOU	Absence	Absence

Pour en savoir plus sur les doryphores, vous pouvez consulter [le BSV Grandes cultures n°17 du 29 mai 2025](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. La vigilance est de mise car les conditions météorologiques sont propices à leur activité.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 foyers pour 1000 m² observés dans la parcelle (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves au total).

CICADELLE



Cette semaine, une faible présence de cicadelles adultes a été signalée à Villeron (95), 15 % des pousses observées sont impactées.

Des piqûres ont également été observées à Méréville (91), La Houssaye-En-Brie (77) et à Villeron (95).

À noter que des piqûres attribuées aux cicadelles avaient déjà été signalées la semaine dernière à Puisieux (77).

Pour avoir des informations sur les cicadelles,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/bsv-grandes-cultures-no21-du-24-juin-2025-a4100.html>



Piqûres de cicadelles (FREDON Ile de France)

OIGNON

3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Pour les oignons semis, 5 feuilles à 30 % de sa taille finale.

MALADIES

Mildiou, *Peronospora destructor*



D'après le modèle Miloni de la DGAL, une nouvelle contamination a été enregistrée le 7 juillet pour la station de Boissy-sans-Avoir (78) engendrant la 3^{ème} génération de mildiou. La date prévue d'apparition des sorties de taches n'est pas attendue avant le 16 juillet. Pour les autres postes météorologiques, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée.

	Données du modèle au 08/07/2025			Date prévue de sortie de taches	Risque mildiou	
	Dates des dernières contaminations	Génération	% d'incubation		Oignons bulbilles	oignons semis
Boissy-sans-Avoir - 78	07-juil	3 ^{ème}	5%	pas avant le 16/07		
Villenoy - 77	Aucune nouvelle conntamination					
Lumigny - 77	Aucune nouvelle conntamination					
Les Mureaux - 78	Aucune nouvelle conntamination					
Torfou - 91	Aucune nouvelle conntamination					
Vémars -95	Aucune contamination					
Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions météorologiques).						

A RETENIR

Risque : A ce jour, aucun risque quel que soit le poste météorologique.

En présence de mildiou sporulant en parcelle, le risque est immédiat quelle que soit la génération.

Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.

Seuil indicatif de risque :

Pour les oignons bulbilles, dès la 2^{ème} génération.

Pour les semis, dès la 3^{ème} génération.

Pour avoir des informations sur le cycle du mildiou de l'oignon, consultez le [BSV grandes cultures n°13 du 07 mai 2025](#) et la fiche "[Modèle MILONI: Mildiou de l'oignon](#)". Cette dernière informe également des mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement du mildiou.

MESURES PROPHYLACTIQUES

Consultez le [BSV grandes cultures n°14 du 13 mai 2025](#).

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

RAVAGEURS

• THRIPS - *Thrips tabaci*



Les infestations de thrips restent présentes cette semaine dans les parcelles suivies (voir le tableau ci-dessous). Des auxiliaires ont été observés, en particulier *Aeolothrips intermedius* à Méréville (91). A Torfou (91), nous notons la présence de coccinelles adultes.

	Nombre moyen d'individu par pied (% de pieds touchés)		
	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28
91-TORFOU	0,4	0,9	0,1
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	1,1	1	0,4
91- LE MÉRÉVILLOIS	1,3	0,5	0,2

Pour avoir plus d'information sur le cycle de développement des thrips et leur reconnaissance, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°14 du 13 mai 2025](#) ou le [site Ephytia](#).

A RETENIR

Risque : faible, aucune parcelle n'a dépassé le seuil indicatif de risque. Des auxiliaires sont observés.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

• MOUCHE MINEUSE



Cette semaine aucune galerie de *Lyriomyza cepae* ni individu n'ont été observés sur l'ensemble des parcelles suivies dans le réseau.

Pour avoir des informations sur La mouche mineuse, [consultez le BSV maraichage n°10 du 12 juin 2025](#).



Galeries de *Lyriomyza cepae*
(FREDON Ile de France)

STADES

Fraises hors-sols sous abri : fruits rouges à récolte.

RAVAGEUR

• PUCERONS



La grande majorité des sites a subi des infestations au cours des deux dernières semaines.

	Semaine 26		Semaine 27		Semaine 28	
	% de pieds avec pucerons	Nb moyen individus / pied	% de pieds avec pucerons	Nb moyen individus / pied	% de pieds avec pucerons	Nb moyen individus / pied
77 -LA HOUSSAYE-EN-BRIE			15 %	1 à 4 individus	5 %	1 à 4 individus
77 -VILLEROY	1 à 4 individus					
94-PÉRIGNY			5 %		0 %	0
95-CERGY						
78-LE MESNIL-LE-ROI			5 %		0 %	0

Pour avoir plus d'information sur le cycle de développement des pucerons et leur reconnaissance, vous pouvez consulter [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré car aucun site ne dépasse le seuil indicatif de risque mais tous les sites sont touchés. Une surveillance régulière est conseillée afin de suivre l'apparition et l'évolution des populations.

Seuil indicatif de risque : 5 individus pour 10 feuilles.



Des produits de biocontrôle existent

• THRIPS



La semaine dernière, aucun site n'avait été infesté. Cette semaine, un site sur trois est touché (voir le tableau ci-dessous).

	Semaine 26		Semaine 27		Semaine 28	
	% de pieds avec thrips	Nb moyen individus / pied	% de pieds avec thrips	Nb moyen individus / pied	% de pieds avec thrips	Nb moyen individus / pied
77 -LA HOUSSAYE-EN-BRIE	30 %	1	0 %	0	10 %	1
77 -VILLEROY	10 %	1				
94-PÉRIGNY	0 %	0	0 %	0	0 %	0
95-CERGY	0 %	0				
78-LE MESNIL-LE-ROI	0 %	0	0 %	0	0 %	0

Pour avoir plus d'information sur le cycle de développement des thrips et leur reconnaissance, vous pouvez consulter [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#).

A RETENIR

Risque : faible car 1 site est touché sans dépasser le seuil indicatif de risque.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par fleur.



Des produits de biocontrôle existent.

• PUNAISES, *Lygus sp.*

Ces deux dernières semaines, des dégâts sur fruits ont été observés successivement au Mesnil-le-Roi (78) et à Périgny (94) sur 50 et 30 % des pieds.

Pour avoir de plus amples informations, consulter « [LES PUNAISES EN CULTURE DE FRAISES : ELEMENTS DE RECONNAISSANCE](#) » de FREDON Haut-de-France.



Dégâts de punaises (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Surveillez l'évolution des populations et l'émergence de jeunes larves dans vos cultures afin de détecter les premiers individus, ou à défaut les premiers dégâts.

• ACARIENS



Cette semaine, aucune infestation n'a été enregistrée. La semaine dernière, les infestations concernaient 30 % des pieds à Périgny (94) et 50 % au Mesnil-le-Roi (78) (voir le tableau ci-dessous).

	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28
	% de pieds touchés	% de pieds touchés	% de pieds touchés
77 -LA HOUSSAYE-EN-BRIE	30 %	0 %	0 %
77 -VILLEROY	0 %		
94-PÉRIGNY	0 %	30 %	0 %
95-CERGY	10 %		
78-LE MESNIL-LE-ROI	5 %	50 %	0 %

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques des prochains jours pourraient augmenter le risque.

Seuil indicatif de risque : 5 formes mobiles par feuille.



Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE ACARIEN / FRUITS ROUGES / ACHEI (organophosphorés) EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

DROSOPHILE, *Drosophila suzukii*



Ces quinze derniers jours, seuls les sites de Villeroy (77) et de La Houssaye-en-Brie (77) ont permis d'enregistrer des captures. Des dégâts sur fruits ont été observés sur deux sites (voir le tableau ci-dessous).



Femelle drosophile suzukii en train de pondre (FREDON Ile de France)

	Semaine 27		Semaine 28	
	Piège Nb individus	% pieds dégâts sur fruits	Piège Nb individus	% pieds dégâts sur fruits
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	4	0	3	0
95-CERGY				
77-VILLEROY	2	0		
78-LE MESNIL-LE-ROI	0	0	0	10
94-PÉRIGNY	0	5	0	10

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Eviter les points d'eau stagnante, en maîtrisant l'irrigation.

Aérer les cultures en taillant le feuillage.

Eliminer l'ensemble des fruits non récoltés et de les évacuer en dehors du site de production.

Récolter tous les deux jours pour limiter les dégâts.



Des produits de biocontrôle existent.

• ALEURODE, *Aleyrodes fragariae*



Ces deux dernières semaines, aucun aleurode n'a été observé dans l'ensemble des sites suivis dans le réseau.

Il y a deux semaines des aleurodes avaient été observés à Cergy (95) sur 5 % des pieds avec en moyenne 1 à 3 individus par pieds.

Pour rappel, le développement important de cet insecte peut provoquer la production de miellat et donc l'apparition de fumagine.

A RETENIR

Risque : faible. Un seul site est touché la semaine dernière mais le seuil indicatif n'a pas été atteint. A surveiller compte tenu des conditions météorologiques qui vont être favorables à leur développement.

Seuil indicatif de risque : de 10 % des pieds avec plus de 10 aleurodes.



Des produits de biocontrôle existent.

• OÏDIUM



Ces deux dernières semaines, aucun symptôme d'oïdium n'a été observé dans l'ensemble des sites suivis dans le réseau.

Pour en savoir plus, consultez [le BSV maraichage n°06 du 15 mai 2025](#).

A RETENIR

Risque : nul, la maladie n'est observée sur aucun site.



Oïdium sur fraises (FREDON Ile de France)

METHODES ALTERNATIVES :

Supprimer et détruire les feuilles et les fruits touchés permet de limiter la prolifération de la maladie dès les premières taches.

Aérer les abris permet de limiter son développement



Des produits de biocontrôle existent.

• BOTRYTIS, *Botrytis cinerea*



Cette semaine, aucun symptôme de botrytis n'a été observé. La semaine, dernière, 10 % des pieds ont été touchés à la Houssaye-en-Brie (77).

Pour en savoir plus, consultez [le BSV maraichage n°08 du 28 mai 2025](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions actuelles sous abri sont propices au développement de cette maladie, surveillez vos cultures.



Symptômes de botrytis sur fruits (FREDON Ile de France)

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Aérer les abris limite son développement.

METHODES ALTERNATIVES :

Nettoyer les plants de leurs vieilles feuilles améliore la circulation de l'air au niveau des cœurs et réduit ainsi l'humidité.

Éliminer les fruits ou toute partie touchés limite la prolifération de la maladie.



Des produits de biocontrôle existent.

STADES

12 à 18 feuilles à récolte

RAVAGEURS

PUCERONS, *Nasonovia ribisnigri*

Cette semaine, des pucerons ont été observés à Torfou (91) sur 15 % des pieds ainsi qu'à La Houssaye-en-Brie (77) sur 10 % des plantes. La semaine dernière, les infestations avaient été signalées sur 20 % des pieds à La Houssaye-en-Brie (77).

Des auxiliaires ont été observés sur la majorité des sites au cours des deux dernières semaines. A Torfou (91) et à La Houssaye-en-Brie (77), des coccinelles adultes ont été repérées. Des syrphes, aussi bien au stade larvaire qu'adulte, ont été détectés à Chevry-en-Sereine (77) et à Cergy (95). Dans cette dernière commune, la présence simultanée de larves et de coccinelles adultes a également été constatée.

Pour avoir un descriptif du ravageur, consultez le [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#)

A RETENIR

Risque : modéré. Les conditions météorologiques à venir devraient être favorables à leur prolifération.

Seuil indicatif de risque : 20 % des pieds avec au moins 1 aptère.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Consultez le [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#)



Des produits de biocontrôle existent.



LE GROUPE PUCERON *Nasonovia ribisnigri* / SALADES / PYRETHRINOÏDES DE SYNTHÈSE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

LE GROUPE PUCERON *Nasonovia ribisnigri* / SALADES / ACHEI (CARBAMATES) EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE RESISTANCE.

• OISEAUX



Cette semaine à Cergy (95), des dégâts de corvidés et de pigeons ont été observés sur salade.

Peu de moyens sont à la disposition des producteurs et pour ceux qui existent l'efficacité peut être limitée. La pose de filets, de bâches et d'effraies restent les moyens les plus pratiqués mais augmentent considérablement les temps de travaux et des coûts supplémentaires.

MALADIES

• BOTRYTIS, *Botrytis cinerea*



Ces deux dernières semaines aucun site n'a présenté des symptômes.

Pour en savoir plus, consultez le [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#)

A RETENIR

Risque : nul, les conditions météorologiques ne devraient pas favoriser le développement de la maladie.

• MILDIOU



Cette semaine, aucun symptôme de mildiou n'a été observé dans l'ensemble des parcelles suivies dans le réseau. Il faut néanmoins être vigilant car les conditions météorologiques sont favorables au développement de cette maladie.

Pour en savoir plus, consultez [le BSV maraichage n°12 du 26 juin 2025](#).

A RETENIR

Risque : nul, les conditions météorologiques sont propices à son développement.



Des produits de biocontrôle existent.

LE GROUPE MILDIOU DE LA LAITUE / PHENYLAMIDES EST EXPOSE A UN RISQUE DE RESISTANCE.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Désherber soigneusement la parcelle.

TOMATE

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

1er fruit atteint taille et à récolte

RAVAGEURS

• PUCERONS



Cette semaine, aucune infestation de pucerons n'a été enregistrée. La semaine dernière, les infestations de pucerons ont eu lieu sur la quasi-totalité des parcelles (voir le tableau ci-dessous). Des auxiliaires araignées ont été observés à Cergy (95), Périgny (94) et au Mesnil-le-Roi (78).

Pour en savoir plus, consultez le [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#).

	semaine 27				semaine 28			
	Puceron - % plante				Puceron - % plante			
	Absence	<10 indiv. isolés	Au moins une colonie sur 1 à 3 feuilles	Plusieurs colonies sur plus de 3 feuilles et/ou présence de fumagine	Absence	<10 indiv. isolés	Au moins une colonie sur 1 à 3 feuilles	Plusieurs colonies sur plus de 3 feuilles et/ou présence de fumagine
77 -LA HOUSSAYE-EN-BRIE	65%	35%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
91-TORFOU	85%	15%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
94-PÉRIGNY	95%	5%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
95-CERGY	95%	5%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
78-LE MESNIL-LE-ROI	95%	5%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions à venir devraient permettre le développement de ce ravageur.



Des produits de biocontrôle existent.

LES ALEURODES



Cette semaine, des individus ont été observés à Cergy (95) sur 5 % des pieds avec au moins 1 à 3 individus par pied. La semaine dernière aucun individu n'avait été observé. Pour en savoir plus sur ce ravageur, vous pouvez consulter [ici](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Faites des observations sur vos parcelles car les conditions à météorologiques à venir pourraient être favorable à leur développement.

• THRIPS



Lors de ces deux dernières semaines, quelques thrips mais sans dégâts sur les fruits ont été observés au Mesnil-le-Roi (78), Cergy (95) et à La Houssaye-En-Brie (77)

Il convient d'être vigilant vis-à-vis de ce ravageur car il peut être vecteur du virus TSWV (maladie bronzée de la tomate). Les dégâts peuvent être très graves, notamment en cas d'infestations précoces. Pour avoir de plus amples informations sur ce virus, vous pouvez consulter la fiche [« Tomato spotted wilt virus \(TSWV\) »](#).

A RETENIR

Risque : faible à modéré car il y a peu de thrips observés et trois sites touchés. A surveiller avec l'augmentation des températures qui sont propices à leur développement.

TECHNIQUES ALTERNATIVES :

Mettre en place de pièges englués jaunes ou bleus pour suivre l'apparition du ravageur, les vols et faire du piégeage massif.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

MALADIE

- **OÏDIUM** - *Pseudoidium neolycopersicii* ou *Leveillula taurica*



Cette semaine, des symptômes d'oïdium ont été observé à Périgny (94) et à Cergy (95) sur 1 % des pieds.
Pour en savoir plus sur ce ravageur, vous pouvez consulter [BSV maraichage n°10 du 12 juin 2025](#).

A RETENIR

Risque : faible car peu de sites touchés et les températures actuelles sont peu favorables à leur développement.



Des produits de biocontrôle existent.

- **BOTRYTIS**



Ces deux dernières semaines, des symptômes de botrytis ont été observées sur à Cergy (95) sur 1 % des pieds.

Pour en savoir plus sur ce ravageur, vous pouvez consulter [BSV maraichage n°6 du 15 mai 2025](#).



Botrytis sur tomate (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques sous abri peuvent toutefois être propices au développement du champignon.



Des produits de biocontrôle existent.

- **CLADOSPORIOSE**



Les symptômes sont des taches vert clair à jaune pâle, aux contours diffus, circulaires à angulaires, situées plutôt sur les folioles des feuilles basses. Le centre des taches brunit avec le temps, se nécrose puis se dessèchent. Les feuilles s'enroulent alors sur elle-même.

Un duvet d'abord blanchâtre, puis violacé à brun olivâtre, recouvre les taches à la face inférieure du limbe.
Ce champignon affectionne particulièrement les températures de l'ordre de 20 à 25°C et des ambiances humides, mais en-dessous de 11°C, son développement s'arrête.

Ces deux dernières semaines des symptômes de cladosporiose ont été observés à Périgny (94) sur quelques plantes.

A RETENIR

Risque : faible à modéré Les conditions sous abri peuvent être propices à son développement.

CHOU

1 à 2 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

6 feuilles à récolte

RAVAGEURS

• ALTISES, *Phyllotreta* SPP



Ces deux dernières semaines, nous notons la présence des altises dans deux des parcelles suivies dans le réseau. Les deux ont été fortement touchées par le ravageur (voir le tableau ci-dessous).

	Semaine 27		Semaine 28	
	% de pieds touchés	Nombre moyen d'individu par pied	% de pieds touchés	Nombre moyen d'individu par pied
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE				
91-TORFOU	100%	4,5		
94-PÉRIGNY	0 %	0	50 %	3

Pour avoir un descriptif du ravageur, consultez le [BSV maraichage n°4 du 30 avril 2025](#).

A RETENIR

Risque : Pour les choux dont le stade est inférieur à 6 feuilles, le risque est modéré à important. Pour les choux ayant dépassé le stade 6 feuilles, le risque est faible voire nul. Les conditions météorologiques des jours à venir vont être propices à leur développement.

Seuil indicatif de risque : 1 altise par plante jusqu'au stade 6 feuilles.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Pose d'un filet anti-insectes pendant le stade sensible.

• MOUCHE DU CHOU, *DELIA RADICUM*



Ces deux dernières semaines, aucun œuf n'a été relevé dans l'ensemble des parcelles du réseau.

Pour en savoir sur le cycle de ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV Maraichage n°6 du 15 mai 2025](#)



Deux œufs de la mouche du Chou
(FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : nul, aucune capture n'a été réalisée.

Seuil indicatif de risque : 2 œufs / piège / semaine.

METHODES PROPHYLACTIQUES :

Bâcher les plantations pour limiter les pontes aux pieds des plants.

Biner permet de contrôler la mouche du chou : la bineuse détruira les œufs de mouches ou les remontera à la surface où ils se dessècheront.



Des produits de biocontrôle existent.

• PUCERON CENDRE



Ces deux dernières semaines aucune infestation de pucerons cendrés n'a été observée dans l'ensembles des parcelles (voir le tableau ci-dessous) .

	% de pieds touchés	
	Semaine 27	Semaine 28
91-TORFOU	0 %	
94-PERIGNY	0 %	0 %
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE		

A RETENIR

Risque : nul. Les conditions météorologiques à venir devraient être favorable à leur développement.

Seuil indicatif de risque : 10 % de pieds touchés.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• PUCERON VERT



Ces deux dernières semaines, aucune infestation de pucerons verts n'a été observée dans l'ensembles des parcelles.

A RETENIR

Risque : nul.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• Noctuelle gamma



Les dégâts occasionnés par la noctuelle gamma sont semblables à ceux provoqués par la piéride du chou et la piéride de la rave, à savoir des défoliations grossières du limbe.

Ces deux dernières semaines, aucune chenille ni dégâts de chenille n'ont été observés dans le réseau.

A RETENIR

Risque : nul.

Seuil indicatif de risque : dès l'apparition des premiers dégâts.

METHODES PROPHYLACTIQUES



• ALEURODE



Ces deux dernières semaines, aucun aleurode n'a été observé sur l'ensemble des parcelles suivies.

Pour en savoir plus sur les aleurodes, vous pouvez consulter [le BSV Maraichage n°6 du 15 mai 2025](#)

A RETENIR

Risque : nul.

Seuil indicatif de risque : de 10 % des pieds avec plus de 10 aleurodes.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.

• TEIGNE DES CRUCIFERES, *Plutella xylostella*




Ces deux dernières semaines, aucune chenille de la teigne des crucifères n'a été observée.

Pour en savoir plus sur ce ravageur, vous pouvez consulter [le BSV maraichage n°10 du 12 juin 2025](#)

A RETENIR

Risque : nul mais il est primordial de réaliser des observations dans vos parcelles sur les faces inférieures des feuilles puisque le vol a débuté.

Seuil indicatif de risque : dès l'apparition des premières chenilles.



Chenille de la teigne des crucifères à la face inférieure d'une feuille de chou (FREDON Ile de France)



Des produits de biocontrôle existent

La semaine dernière, des œufs de piéride du chou ont été observés à Périgny (94) sur 1 % des pieds. **Cette semaine, aucune chenille ni œufs n'ont été observés.**



Chenilles de piéride du chou (en bas) et de piéride de la rave (en haut) (FREDON Ile de France)



Ponte de piéride du chou (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : modéré. Il est donc primordial de réaliser des observations dans vos parcelles sur les faces inférieures des feuilles puisque le vol a débuté.

Seuil indicatif de risque : dès l'apparition des premières chenilles.



La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Enfin, les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : <http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p.inra.fr/fr/home/>

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière arboriculture maraîchage.

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

- **Observations :** FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction :** FREDON Ile de France – Céline GUILLEM, Ismaël MOINDZIWA.
- **Comité de relecture :** Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.