BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
ÉCOPHYTO

Ile de France
Maraîchage

N° 24
02/10/25

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

CRESSON : la surveillance des pucerons est de mise, les infestations ont augmenté. Des chrysomèles sont toujours observées.

Station de Périgny (94) :

	jeu. 2	ven. 3	sam. 4	dim. 5	lun. 6	mar. 7	mer. 8
	0	4.7	6.5	0	0.2	0	0
	45 / 95	50 / 86	49 / 94	49 / 88	57 / 100	52 / 87	65 / 100
	7 / 17	11 / 17	11 / 18	9 / 16	9 / 19	8 / 21	11 / 18

Source : Sencrop, modèle METEOBLUE.

CRESSON

5 SITES OBSERVES DANS LE RESEAU

RAVAGEURS

• CHIRONOMES

Des chironomes adultes ont été piégés dans toutes les cressonnières suivies avec une hétérogénéité entre sites observés mais aussi entre les bassins d'un même site.

	Nombre moyen de chironomes capturés / semaine dans les cuvettes	
	S 38	S 40
MOIGNY S/ECOLE	0	1
MAISSE	20,75	8
D'HUISON-LONGUEVILLE	0	0,75
CHALO-SAINT-MARS	2,5	1,25
MEREVILLE	1,75	23,25

Par rapport aux années précédentes, le nombre d'individus capturés cette semaine est légèrement supérieur aux deux dernières saisons mais inférieur à celles enregistrées en 2022 et 2008, référence haute (voir le graphique ci-dessous).



Cette semaine, de faibles nuées sont observées au-dessus des bassins sur tous les sites suivis.

Des larves ont également été observées en faibles quantités dans trois des cinq cressonnières suivies contre quatre sites il y a 15 jours (voir le tableau ci-dessous).

	Nombre de larves de chironomes							
	S 38				S 40			
Note de	0	1	2	3	0	1	2	3
MOIGNY S/ECOLE	95 %	5 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
MAISSE	95 %	5 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	90 %	10 %	0 %	0 %	95 %	5 %	0 %	0 %
CHALO-SAINT-MARS	100 %	0 %	0 %	0 %	95 %	5 %	0 %	0 %
MEREVILLE	95 %	10 %	0 %	0 %	90 %	10 %	0	0

Note de : 0 : aucune larve
1 : entre 1 et 3 larves par pied
2 : entre 4 et 8 larves par pied
3 : plus de 8 larves par pied

Pour plus d'informations sur ce ravageur, consultez le BSV maraichage 2025_22.

A RETENIR

Risque : faible à modéré. Les conditions météorologiques annoncées dans les prochains jours pourraient permettre le survol des chironomes adultes au-dessus des bassins et d'éventuelles pontes.

Seuil indicatif de risque : 20 % de pieds touchés avec au moins une larve.

• CHRYSOMELE DU CRESSON, *Phaedon cochleariae*

Les populations de chrysomèles sont en diminution par rapport aux infestations relevées il y a 15 jours.
Des dégâts sont visibles dans tous les sites avec des intensités d'attaque différentes entre eux mais également entre bassins d'une même cressonnière.

	% des pieds avec des larves/ adultes de chrysomèle	
	S 38	S 40
MOIGNY S/ECOLE	35 %	15 %
MAISSE	10 %	5 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	13 %	5 %
CHALO-SAINT-MARS	15 %	10 %
MEREVILLE	5 %	5 %

Chrysomèle du cresson (FREDON Ile de France)

Pour plus d'informations sur ce ravageur, consultez le BSV maraichage 2025_22.

A RETENIR

Risque : faible à important selon les bassins. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin.

METHODES ALTERNATIVES :

La lutte peut se faire par élévation du niveau de l'eau et écumage des insectes.

• CHENILLES DEFOLIATRICES ET TENTHREDES

Lors du dernier relevé, il y a 15 jours, des chenilles de la piéride de la rave avaient été observées à D'Huison-Longeville. **Cette semaine, aucune chenille n'a été observée dans les bassins.**
Des adultes de tenthrèdes ont été relevés dans les cuvettes jaunes à Maisse.

A RETENIR

Risque : nul.

• PUCERONS

Cette semaine, des pucerons verts ont été observés dans plusieurs cressonnières (voir le tableau ci-dessous).
A noter qu'une grande hétérogénéité entre bassins est observée dans une même cressonnière. Aucune crispation foliaire n'a pour l'heure été observée.

	% des pieds touchés	
	S 38	S 40
MOIGNY S/ECOLE	5 %	0 %
MAISSE	0 %	10 %
D'HUISON-LONGUEVILLE	0 %	5 %
CHALO-SAINT-MARS	0 %	5 %
MEREVILLE	0 %	0 %

Pucerons verts (FREDON Ile de France)

Pour avoir plus d'information sur les pucerons et notamment les dégâts qu'ils occasionnent, vous pouvez consulter le BSV maraîchage 2025_23.

A RETENIR

Risque : modéré, les infestations sont en augmentations et les conditions météorologiques à venir vont être propices à leur développement. Il est primordial de réaliser des observations dans vos bassins afin d'évaluer le risque par bassin car une **présence même faible durant plus de 10 jours peut induire un risque de virose.**

• MOUCHE DU CRESSON, *Hydrellia Nasturtii et Hydrellia sp*

L'adulte pond les œufs sur les tiges du cresson lors de périodes chaudes. La larve creuse la tige, la rendant plus fragile à la cassure et favorisant un port couché du cresson défavorable à la pousse. Les lésions laissées par la larve permettent également à certaines maladies comme *Spongospora subterannea Nasturtii* de se développer.

Cette semaine, des pupes de la mouche du cresson ont été observées uniquement à Maisse sur 5 % des pied avec en moyenne moins d'une pupe par pied.

Pupe de la mouche du cresson (FREDON Ile de France)

A RETENIR

Risque : assez faible pour le moment.

La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole.

Enfin, les substances de base sont référencées par l'ITAB à cette adresse : http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres.

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/.

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière arboriculture maraichage. :https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-legumes-r736.html.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html.

- **Observations :** FREDON Ile de France, Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France.
- **Rédaction :** FREDON Ile de France – Céline GUILLEM.
- **Comité de relecture** : Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, SRAL.